



指導箋変更のご案内

ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤
ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤

ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」

ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」

2024年5月

各位

日本ジェネリック株式会社

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび『ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」』及び『ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」』につきまして、指導箋の変更をさせていただきますので下記のとおりご案内いたします。

今後とも引き続き弊社製品を御愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

※画像の色調が現物と若干異なる場合がありますので、ご了承ください。

本剤をより正しく使用していただくため、2019年12月発売以降、弊社に寄せられた情報をもとに、使用方法に関する指導箋を大幅に改訂いたしましたので、下記の通りご案内いたします。

なお、**中の薬剤及び使用方法の変更はございません。**

旧

新

ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」/ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」の使用法

使用手順

吸入器の各部の名前については裏面をご覧ください

ステップ1: キャップをはずします。使用前に「使用前説明書」を確認してください。

ステップ2: オレンジグリップを左に回します。吸入器の奥の奥に奥まで回してください。

ステップ3: この状態でオレンジグリップを握り続け、奥まで握ってください。

ステップ4: そのままオレンジグリップを握り続け、奥まで握ってください。

ステップ5: 奥まで握り続け、奥まで握ってください。

ステップ6: オレンジグリップを右に回します。奥まで回してください。

ステップ7: キャップをしっかり閉めます。奥まで閉めてください。

新たに開封した吸入器での準備操作

まっすぐ立てます。

オレンジグリップを左に回してください。
「カチン」音4回で準備操作完了です。
そのまゝの状態で通常使用してください。

誤った使用法

オレンジグリップを右に回さないでください。

オレンジグリップを握り続けず、奥まで握ってください。

吸入器に対して奥まで握ってください。

奥まで握り続けず、奥まで握ってください。

口に奥まで握り続けず、奥まで握ってください。

口に奥まで握り続けず、奥まで握ってください。

各部の名前

キャップ

オレンジグリップ

吸入器本体

マウスピース

吸入器本体

マウスピース

残量計の表示

残量計の表示は吸入可能なおおよその吸入数を表示しています。

オレンジグリップを回すたびに文字盤が少しずつ回転するので、必要以上に回さないでください。必要以上に回すと、残量計の表示が正確になりません。

残量計の表示は、(1) が必要以上に回すと、文字盤が正確になりません。新しい吸入器に交換してください。

使用開始時

表示の読み方

吸入器交換時

30吸入用

60吸入用

30-15=15

60-40=20

(1) が必要以上に回すと、文字盤が正確になりません。

吸入についての注意事項

・本薬を使用される前、医師または薬剤師の指導を受けてください。

・オレンジグリップを回す時、オレンジグリップを反時計回りに回し、時計回りに戻す時(戻したときに「カチン」音が「目」します)を行ってください。吸入の回数(セット)を数えます。この操作を繰り返していても、薬量は1吸入分しかセットできませんので、必要以上に回さないでください。

・白濁の吸入器をお持ちで、オレンジグリップを回す時、「カチン」音がしますが、このとき薬量はセットされておらず、正しく吸入することにはなりません。必ずしもオレンジグリップを回す時、オレンジグリップを回す時、必ずしもオレンジ

変更品の出荷時期と初回製造番号

製品名	包装単位	出荷予定時期	初回製造番号	使用期限
ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」	1本	2024年8月頃	未定	未定
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	1本	2024年6月中旬	401030	2025年12月

製品の流通状況により、変更品のお届けまでに多少の時間を要する場合がありますので、ご了承くださいませ。

変更品の個装箱表示

- ・この度の変更に際しましては、個装箱に変更品を示す表示はございません。

お問い合わせ先

お客さま相談室：0120-893-170

以 上

包装変更などのお知らせ文書は、弊社の医療関係者向けホームページにも掲載しております。

<https://medical.nihon-generic.co.jp/>



日本ジェネリック株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号