

一般名:ロスバスタチンカルシウム

	自 社 製 品	類 似 薬
		ロスバスタチン錠 2.5mg・5mg「JG」 ロスバスタチン OD 錠 2.5mg・5mg「JG」
効能・効果	①高コレステロール血症	①高コレステロール血症 ②家族性高コレステロール血症
用法・用量	通常、成人にはロスバスタチンとして1日1回2.5mgより投与を開始するが、早期にLDL-コレステロール値を低下させる必要がある場合には5mgより投与を開始してもよい。なお、年齢・症状により適宜増減し、投与開始後あるいは増量後、4週以降にLDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には、漸次10mgまで増量できる。10mgを投与してもLDL-コレステロール値の低下が十分でない重症患者に限り、更に増量できるが、1日最大20mgまでとする。	通常、成人にはロスバスタチンとして1日1回2.5mgより投与を開始するが、早期にLDL-コレステロール値を低下させる必要がある場合には5mgより投与を開始してもよい。なお、年齢・症状により適宜増減し、投与開始後あるいは増量後、4週以降にLDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には、漸次10mgまで増量できる。10mgを投与してもLDL-コレステロール値の低下が十分でない、 <b>家族性高コレステロール血症患者など</b> の重症患者に限り、更に増量できるが、1日最大20mgまでとする。