

一般名:リセドロン酸ナトリウム水和物

	自 社 製 品	類 似 薬
	リセドロン酸 Na 錠 17.5mg「JG」	アクトネル錠 17.5mg ベネット錠 17.5mg
効能・効果	①骨粗鬆症	①骨粗鬆症 ②骨ペーজেット病
用法・用量	①骨粗鬆症 通常、成人にはリセドロン酸ナトリウムとして 17.5mg を 1 週間に 1 回、起床時に十分量(約 180mL)の水とともに経口投与する。 なお、服用後少なくとも 30 分は横にならず、水以外の飲食並びに他の薬剤の経口摂取も避けること。	①骨粗鬆症 通常、成人にはリセドロン酸ナトリウムとして 17.5mg を 1 週間に 1 回、起床時に十分量(約 180mL)の水とともに経口投与する。 なお、服用後少なくとも 30 分は横にならず、水以外の飲食並びに他の薬剤の経口摂取も避けること。 ②骨ペーজেット病 通常、成人にはリセドロン酸ナトリウムとして 17.5mg を 1 日 1 回、起床時に十分量(約 180mL)の水とともに 8 週間連続経口投与する。 なお、服用後少なくとも 30 分は横にならず、水以外の飲食並びに他の薬剤の経口摂取も避けること。