

リバーロキサバンOD錠「JG」 服用される患者さまへ

このお薬は、血を固まりにくくすることで血管内で血が固まって生じる疾患（血栓塞栓症）を予防あるいは治療するお薬です。

服用にあたっての注意

必ず指示された使用方法に従って服用してください。

◆飲み忘れてしまった場合（1日1回服用のとき）

当日

飲み忘れに気付いたときに、すぐ1回分を飲んでください。
一度に2回分以上飲まないでください。

次の服用まで **12時間以上** 空けてください

翌日

翌日から、毎日1回、必ず服用してください。

服用中の注意①

次のような症状があらわれた場合には、すぐに医師にご連絡ください。

●出血の症状

- ・ 重大な出血の主な症状：ひどい頭痛、悪心（吐き気）・嘔吐、血を吐く、血便・血尿
- ・ よく起こる出血の症状：歯ぐきからの出血、鼻血、皮下出血（あおあざがでやすい）

●貧血の症状

顔色が悪い、疲れやすい、だるい、頭が重い、動悸、息切れ など

●黄疸などの肝機能障害

倦怠感（からだがだるい）、黄疸（白目や皮膚が黄色くなる）

●間質性肺疾患

呼吸困難（日常動作で呼吸が苦しい、息が切れる）、空咳（痰が出ない乾いた咳）

●急性腎障害

尿量低下（尿が出ない、量が少ない）、浮腫（顔や手足がむくむ）

（裏面もお読みください）

服用中の注意②

次のようなことがある場合には、必ず事前に医師または薬剤師にご相談ください。

- ・他の医療機関で治療を受ける場合
- ・歯の治療や内視鏡検査を受ける場合
- ・外科的手術を受ける場合
- ・他の医療機関で他の薬を処方された場合や市販薬を購入する場合

出血について

◆止血対策

- ・けがなどによる出血のとき⇒ガーゼやハンカチなどで直接強くおさえる（圧迫止血）
- ・鼻血のとき⇒座って軽く下を向き、鼻を強くつまむ

ただし、以下にあてはまるときは、すぐにご連絡ください。

- 血便、血尿が出る
- 腫れ上がるような皮下出血（あおあざ）がある
- 上記の止血対策を行っても、血が止まらない
- その他、出血が気になるとき

出血を避けるために、次の点にご注意ください。

- *ヒゲを剃るときは電気カミソリを使用してください。
- *歯ブラシはやわらかめを使用してください。
- *鼻をかむときはやさしくしてください。
- *ケガのおそれがある仕事や運動は、なるべく避けてください。

気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。