

アセトアミノフェン細粒20%「JG」

1日投与量体重別早見表

効能・効果

小児科領域における解熱・鎮痛

用法・用量

通常、乳児、幼児及び小児にはアセトアミノフェンとして、**体重1kgあたり1回10～15mg**を経口投与し、**投与間隔は4～6時間以上とする**。なお、年齢、症状により適宜増減するが、**1日総量として60mg/kgを限度とする**。ただし、**成人の用量を超えない**。また、空腹時の投与は避けさせることが望ましい。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

「小児科領域における解熱・鎮痛」の効能又は効果に対する1回あたりの最大用量はアセトアミノフェンとして500mg、1日あたりの最大用量はアセトアミノフェンとして1500mgである。

本剤1g中
アセトアミノフェン200mgを含有

体重	1日投与量 (分4、投与間隔6時間)			1日投与量 (分6、投与間隔4時間)			体重
	細粒として	アセトアミノフェンとして 10mg/kg/回 ×1日4回	アセトアミノフェンとして 15mg/kg/回 ×1日4回	細粒として	アセトアミノフェンとして 10mg/kg/回 ×1日6回	アセトアミノフェンとして 15mg/kg/回 ×1日6回	
4kg	0.8g	160mg	240mg	1.2g	240mg	360mg	4kg
5kg	1.0g	200mg	300mg	1.5g	300mg	450mg	5kg
6kg	1.2g	240mg	360mg	1.8g	360mg	540mg	6kg
7kg	1.4g	280mg	420mg	2.1g	420mg	630mg	7kg
8kg	1.6g	320mg	480mg	2.4g	480mg	720mg	8kg
9kg	1.8g	360mg	540mg	2.7g	540mg	810mg	9kg
10kg	2.0g	400mg	600mg	3.0g	600mg	900mg	10kg
11kg	2.2g	440mg	660mg	3.3g	660mg	990mg	11kg
12kg	2.4g	480mg	720mg	3.6g	720mg	1080mg	12kg
13kg	2.6g	520mg	780mg	3.9g	780mg	1170mg	13kg
14kg	2.8g	560mg	840mg	4.2g	840mg	1260mg	14kg
15kg	3.0g	600mg	900mg	4.5g	900mg	1350mg	15kg
16kg	3.2g	640mg	960mg	4.8g	960mg	1440mg	16kg
17kg	3.4g	680mg	1020mg	5.1g	1020mg	1500mg	17kg
18kg	3.6g	720mg	1080mg	5.4g	1080mg		18kg
19kg	3.8g	760mg	1140mg	5.7g	1140mg		19kg
20kg	4.0g	800mg	1200mg	6.0g	1200mg		20kg
21kg	4.2g	840mg	1260mg	6.3g	1260mg		21kg
22kg	4.4g	880mg	1320mg	6.6g	1320mg		22kg
23kg	4.6g	920mg	1380mg	6.9g	1380mg		23kg
24kg	4.8g	960mg	1440mg	7.2g	1440mg		24kg
25kg	5.0g	1000mg	1500mg	7.5g	1500mg		25kg
26kg	5.2g	1040mg					26kg
27kg	5.4g	1080mg				27kg	
28kg	5.6g	1120mg				28kg	
29kg	5.8g	1160mg				29kg	
30kg	6.0g	1200mg				30kg	
31kg	6.2g	1240mg				31kg	
32kg	6.4g	1280mg				32kg	
33kg	6.6g	1320mg				33kg	
34kg	6.8g	1360mg				34kg	