

アナストロゾール錠1mg「JG」

服用される患者さまへ



■ 服用方法

- 主治医の指示に従い、1日1錠を毎日服用します。
- お薬は包装（PTPシート）から取り出し、コップ1杯程度の水（またはぬるま湯）で飲んでください。
- 主治医の指示なしに服用をやめないでください
- 高齢の患者さまでは、特に主治医の指示を守って服用してください。

■ 薬を服用し忘れた場合

気がついたときに、できるだけ早く服用してください。

ただし次の服用時間がせまっている場合は1回分とばし、次の通常の服用時間に1回分を服用します。

絶対に2回分を一度に服用しないでください

■ あやまって多く服用した場合

すぐに主治医または薬剤師に相談してください。

（裏面もお読みください。）

＊服用・保管上の注意点＊

- 次のような人は、使う前に主治医に相談してください。
 - ・ 以前にお薬を飲んで発疹などが出たことのある人
 - ・ 肝臓や腎臓に病気がある人
- 眠気や意識がぼんやりするといった症状が現れるかもしれませんので、自動車の運転や機械を操作するときは注意してください。
- 他のお薬と併用する場合は、薬局で買ったお薬も含め、そのお薬について必ず主治医に伝えてください。
- 他の医療機関を受診する場合や薬局でお薬を買う場合は、このお薬を服用していることを伝えてください。
- お薬は光のあたらない涼しいところに保管してください。
子どもの手の届かないところに保管してください。

＊副作用＊

気になる症状があらわれたときは、主治医または薬剤師にすぐにご相談ください。

特に注意すべき副作用

- 全身の皮膚が赤くはれて、発疹、ただれ、水ぶくれができる／皮膚の表面がやけどのようにはれてくる／目が痛い／目が充血する／口の中や鼻の中、結膜などにただれやびらんがおこる／発熱
- 顔、くちびる、舌、のどがはれる／足や陰部がはれる／物が飲み込みにくい／息ができない／発疹がでる
- 発熱／からだがだるい／かゆみ／吐き気／食欲がない／皮膚や白目が黄色くなる
- 息切れがする／息苦しい／から咳が出る／発熱
- 局所の痛みやはれ／胸の痛み／呼吸困難