

# アトモキセチン内用液0.4%「JG」

## 体重別小児投与量早見表

○ 18歳未満の患者さま

体重 (kg)	有効成分として				内用液として			
	1日量(mg) [2回に分割]				1日量(mL) [2回に分割]			
	0.5mg/kg	0.8mg/kg	1.2mg/kg	1.2~1.8mg/kg	0.125mL/kg	0.2mL/kg	0.3mL/kg	0.3~0.45mL/kg
16	8.0	12.8	19.2	19.2~28.8	2.00	3.2	4.8	4.8~7.2
18	9.0	14.4	21.6	21.6~32.4	2.25	3.6	5.4	5.4~8.1
20	10.0	16.0	24.0	24.0~36.0	2.50	4.0	6.0	6.0~9.0
22	11.0	17.6	26.4	26.4~39.6	2.75	4.4	6.6	6.6~9.9
24	12.0	19.2	28.8	28.8~43.2	3.00	4.8	7.2	7.2~10.8
26	13.0	20.8	31.2	31.2~46.8	3.25	5.2	7.8	7.8~11.7
28	14.0	22.4	33.6	33.6~50.4	3.50	5.6	8.4	8.4~12.6
30	15.0	24.0	36.0	36.0~54.0	3.75	6.0	9.0	9.0~13.5
32	16.0	25.6	38.4	38.4~57.6	4.00	6.4	9.6	9.6~14.4
34	17.0	27.2	40.8	40.8~61.2	4.25	6.8	10.2	10.2~15.3
36	18.0	28.8	43.2	43.2~64.8	4.50	7.2	10.8	10.8~16.2
38	19.0	30.4	45.6	45.6~68.4	4.75	7.6	11.4	11.4~17.1
40	20.0	32.0	48.0	48.0~72.0	5.00	8.0	12.0	12.0~18.0
42	21.0	33.6	50.4	50.4~75.6	5.25	8.4	12.6	12.6~18.9
44	22.0	35.2	52.8	52.8~79.2	5.50	8.8	13.2	13.2~19.8
46	23.0	36.8	55.2	55.2~82.8	5.75	9.2	13.8	13.8~20.7
48	24.0	38.4	57.6	57.6~86.4	6.00	9.6	14.4	14.4~21.6
50	25.0	40.0	60.0	60.0~90.0	6.25	10.0	15.0	15.0~22.5
52	26.0	41.6	62.4	62.4~93.6	6.50	10.4	15.6	15.6~23.4
54	27.0	43.2	64.8	64.8~97.2	6.75	10.8	16.2	16.2~24.3
56	28.0	44.8	67.2	67.2~100.8	7.00	11.2	16.8	16.8~25.2
58	29.0	46.4	69.6	69.6~104.4	7.25	11.6	17.4	17.4~26.1
60	30.0	48.0	72.0	72.0~108.0	7.50	12.0	18.0	18.0~27.0
62	31.0	49.6	74.4	74.4~111.6	7.75	12.4	18.6	18.6~27.9
64	32.0	51.2	76.8	76.8~115.2	8.00	12.8	19.2	19.2~28.8
66	33.0	52.8	79.2	79.2~118.8	8.25	13.2	19.8	19.8~29.7
68	34.0	54.4	81.6	81.6~120.0*	8.50	13.6	20.4	20.4~30.0*
70	35.0	56.0	84.0	84.0~120.0*	8.75	14.0	21.0	21.0~30.0*

※：1日あたりの最大用量はアトモキセチンとして 120mg (30mL)

### 【用法・用量】（一部抜粋）

#### 1. 18歳未満の患者

通常、18歳未満の患者には、アトモキセチンとして1日0.5mg/kg (0.125mL/kg)より開始し、その後1日0.8mg/kg (0.2mL/kg)とし、さらに1日1.2mg/kg(0.3mL/kg)まで増量した後、1日1.2~1.8mg/kg(0.3~0.45mL/kg)で維持する。ただし、増量は1週間以上の間隔をあけて行うこととし、いずれの投与量においても1日2回に分けて経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、1日量は1.8mg/kg(0.45mL/kg)又は120mg(30mL)のいずれか少ない量を超えないこと。

### 〈効能・効果に関連する使用上の注意〉（一部抜粋）

(1) 6歳未満の患者における有効性及び安全性は確立していない。

### 【使用上の注意】（一部抜粋）

#### 7. 小児等への投与

(1) 低出生体重児、新生児、乳児、6歳未満の幼児に対する有効性及び安全性は確立していない。[6歳未満の小児等を対象とした試験は、実施されていない。]

(2) 投与初期に体重増加の抑制、成長遅延が報告されている。〔2. 重要な基本的注意〕の項参照

その他の詳細につきましては製品添付文書をご参照ください