

アトモキセチン「JG」

服用される患者さまとご家族の方へ

このお薬は、一定の期間服用することで、注意欠陥/多動性障害（AD/HD）の主な症状である「不注意」、「多動性」、「衝動性」の改善が期待できます。

服用時の注意

- ◆ このお薬の成分は、目への刺激性があります。
- ◆ 錠剤の破片や液剤が目に入った場合は、すぐに水で洗い、医師にご相談ください。また、手についた場合は、すぐに手を洗ってください。

〈錠剤を服用される方へ〉

錠剤を分割や粉砕をせず、そのまま飲んでください。

服用中の注意

- ◆ このお薬を服用中に、以下の症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合は、医師または薬剤師にご連絡ください。
 - ◇ 攻撃的な行為や態度、またはこれらの症状の悪化
 - ◇ 死にたいと考える、または関連する行動
 - ◇ 幻覚や幻聴

中面にこのお薬の服用を記録するチェックシートがあります。

（裏面もご覧ください）

服用チェックシート

飲み忘れ防止のため、飲み始めてからしばらくの間はこのお薬の服用を記録しましょう。

《記入例》

服用する日付を書きましょう。

日付	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

1日2回服用の場合は、朝・夕の服用ごとに○をつけてください。

1日1回服用の場合は、ご自分の服用時間に近いほうに○をつけてください。

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

注意が必要な症状

- ◆ 飲み始めにおこりやすい症状
吐き気、食欲減退、眠気、のどが渇く、頭痛などからだがお薬に慣れることで、軽減することがありますが、症状がひどい場合や、他にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- ◆ まれにおこることがある症状
以下の症状があらわれた場合は、服用を中止し、医師にご連絡ください。
 - ◇ 肝機能障害（体がだるい、吐き気、嘔吐など）
 - ◇ 黄疸（白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなるなど）
 - ◇ 肝不全（吐き気、嘔吐、食欲不振、羽ばたくような手のふるえなど）
 - ◇ アナフィラキシー（じんましん、眼と口唇のまわりのはれなど）
- ◆ 眠気、めまいなどをおこすことがあります。自動車の運転などの危険を伴う操作をしないでください。

その他の注意

- ◆ このお薬の服用前および服用中は、定期的に血圧および心拍数（脈拍数）の測定が行われます。
- ◆ 他の診療科を受診するときは、このお薬を服用中であることをかならず伝えてください。

お薬の保管

- ◆ 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところで、直射日光と湿気を避けて室温で保管してください。

気になることがありましたら、医師、薬剤師にご相談ください。