

ブデホル吸入粉末剤「JG」を使用される喘息患者さまへ

ブデホル吸入粉末剤「JG」吸入回数チェックシート

このシートを薬剤師さんにみせてください。

	定期吸入	追加吸入
いずれかに <input checked="" type="checkbox"/>	朝  夜 	発作(症状)*が出た時
<input type="checkbox"/> 定期吸入が 1日 2吸入 の場合	1吸入 1吸入 +	<input type="checkbox"/> 追加吸入可 1日合計 6吸入まで
<input type="checkbox"/> 定期吸入が 1日 4吸入 の場合	2吸入 2吸入 +	<input type="checkbox"/> 追加吸入可 1日合計 4吸入まで
<input type="checkbox"/> 定期吸入が 1日 6吸入 の場合	3吸入 3吸入	*咳、息苦しさなど
<input type="checkbox"/> 定期吸入が 1日 8吸入 の場合	4吸入 4吸入	

1日通常 8吸入まで

★「追加吸入可」に✓がない場合は、追加吸入はできません。

吸入回数について

- 定期吸入と追加吸入を合わせて、**通常1日8吸入**まで可能です。
医師の指示がある場合、一時的に1日12吸入まで可能ですが、**1日8吸入を超える場合や追加吸入の回数が増加した場合は喘息コントロールが十分でない可能性がある**ので、**速やかに医師の診察を受けてください**。
- 追加吸入する場合、まず**1吸入**してください。それでも発作(症状)が治まらない場合は、数分あけてもう1吸入してください。
- 追加吸入する場合は1回の発作(症状)につき、**最大で6吸入**まで可能です。
定期吸入に続いて追加吸入を行う場合は、定期吸入と合わせて**最大6吸入**までです。

