

発作(症状)が出た時にブデホル吸入粉末剤30吸入/60吸入「JG」を追加吸入するように指示された喘息患者様へ

# ブデホル吸入粉末剤「JG」吸入回数確認シート

このシートに毎日の吸入状況を記録しましょう

## ◆医師に指示された吸入回数

毎日の吸入「定期吸入」		発作(症状)が出た時「追加吸入」	
あさ 	<input type="text"/>	よる 	<input type="text"/>
吸入		吸入	
		+	
		1日合計 <input type="text"/>	
		吸入まで	

1本目 使用開始日	年	月	日
2本目 使用開始日	年	月	日
3本目 使用開始日	年	月	日
4本目 使用開始日	年	月	日

## ◆吸入の記録(1吸入ごとに「/」を記入してください)

日付	定期吸入		追加吸入	メモ
	朝	夜	症状発現時	
1	/			
2	/			
3	/			
4	/			
5	/			
6	/			
7	/			
8	/			
9	/			
10	/			
11	/			
12	/			
13	/			
14	/			

日付	定期吸入		追加吸入	メモ
	朝	夜	症状発現時	
15	/			
16	/			
17	/			
18	/			
19	/			
20	/			
21	/			
22	/			
23	/			
24	/			
25	/			
26	/			
27	/			
28	/			
1カ月の追加吸入回数				吸入

## ◆注意事項

- 医師の指示通りに服薬してください。
- 喘息をコントロールするためには、毎日の定期吸入が重要となりますので、必ず行ってください。
- 定期吸入と追加吸入を合わせて、通常1日8吸入まで可能です。医師の指示がある場合、一時的に1日12吸入まで可能ですが、1日8吸入を超える場合や追加吸入の回数が増加した場合は喘息コントロールが十分でない可能性があるため、速やかに医師の診察を受けてください。
- 追加吸入する場合、まず1吸入してください。それでも発作(症状)が治らない場合は、数分あけてもう1吸入してください。
- 追加吸入する場合は1回の発作(症状)につき、最大で6吸入まで可能です。定期吸入に続いて追加吸入を行う場合は、定期吸入と合わせて最大6吸入までです。

## ◆気になったこと、医師に伝えたいこと

ブデホル吸入粉末剤を処方された患者さま向けムービー(気管支喘息編)  
[http://www.nihon-generic.co.jp/medical/data4/BUDEF00\\_MOVIE.html](http://www.nihon-generic.co.jp/medical/data4/BUDEF00_MOVIE.html)



監修:齊藤和人先生(総合病院土浦協同病院・呼吸器内科部長)