カペシタビン錠 300mg「JG」
服用される患者さまへ

大切な注意です。お薬を服用する前に必ずお読みください。

1日2回（朝食後と夕食後それぞれ30分以内）に服用してください。
服用スケジュールは患者さまによって異なります。スケジュールに従ってください。

あなたの服用スケジュール

21日間（3週間）毎日服用し、その後7日間休薬します。



14日間（2週間）毎日服用し、その後7日間休薬します。



5日間毎日服用し、その後2日間休薬します。



（裏面もお読みください）

◆ 絶対に一緒に服用してはいけないお薬

● **テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**

（ティーエスワン® など）

※服用していた場合は少なくとも7日以上間隔をあけてください。

飲み合わせに注意するお薬

● ワルファリンカリウム（血液を固まりにくくするお薬）
● フェニトイン（てんかんのお薬）
● トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤（抗がん薬）

注意する症状

次の症状があらわれたときは医師または薬剤師に連絡してください。

● 発熱・感染症（38度以上の熱）
● 下痢（激しい下痢、水のような便、頻回の軟便）
● 吐き気・嘔吐（吐き気が続く、頻回の嘔吐）
● 手足症候群（手や足にしびれ、ヒリヒリ・チクチク感、赤み、腫れ、痛み）
● 口内炎

この他にも気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

日本ジェネリック株式会社

CAPEC-PG-1JG
2019.12