

セレコキシブ錠100mg・200mg「JG」 服用される患者さまへ

下記の項目であてはまるものがありましたら、医師
または薬剤師にお伝えください。

- ・以前にお薬を飲んで、発疹や喘息症状が出たことがある。
- ・胃潰瘍などの胃腸の病気がある。
- ・心臓、肝臓または腎臓の病気がある。
- ・以前に心臓のバイパス手術などを受けたことがある。
- ・現在、妊娠中または授乳中である。
- ・現在、他のお薬を飲んでいる。

**次の症状がある時は、服薬をやめて、
すぐに医師または薬剤師にお伝えください。**

- ◆ 胸の痛み（数分で消失する痛みの場合でも、医師または薬剤師にご相談ください）
- ◆ ろれつがまわらない
- ◆ 体の片側または一部が麻痺する
- ◆ 息切れ、呼吸困難

（裏面もご覧ください）

主な副作用

- ◆ 腹痛、下痢、吐き気
- ◆ 口内炎
- ◆ 発疹
- ◆ 傾眠

この他にも気になる症状があらわれた場合には、医師または薬剤師にご相談ください。

服用時の注意

- ◆ コップ1杯くらいの水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- ◆ 通常、朝食後と夕食後の1日2回で服用してください。
- ◆ ご自分の判断で、薬の量を増減しないでください。
- ◆ 痛みや腫れがおさまった時には、薬を飲み続けるかどうか、医師にご相談ください。
- ◆ お薬を飲んでいても、あまり効果がないときには、医師にご相談ください。
※関節リウマチ、変形性関節症などの長く続く痛みの場合は、飲み始めてから2～4週間が目安です。

お薬の保管

- ◆ 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところで、直射日光と湿気を避けて室温で保管してください。

気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。