

シロスタゾールOD錠「JG」を服用される患者さまへ

シロスタゾールOD錠50mg「JG」

シロスタゾールOD錠100mg「JG」

## 正しい服用の仕方と注意点

シロスタゾールOD錠50mg「JG」

シロスタゾールOD錠100mg「JG」



## ＝この薬の働き＝

- この薬は、血管の中に血のかたまり（血栓）ができるのを防いだり、血液の流れを良くする働きがあります。
- この薬は、脳梗塞の再発を防ぐためや、足（下肢）の血液の流れが悪い時（慢性動脈閉塞症）の症状を和らげるために使われます。

## ＝この薬の特徴と留意点＝

- この薬は、口の中で溶けるため、水と一緒になくても服用できます。水なしで服用しても効果に違いはありません。
- この薬は、水なしで服用する場合、舌の上に乗せて唾液で湿らせ、軽くつぶして唾液とともに飲み込んでください。

## ＝服用時の注意＝

この薬を飲んで、次のような症状があらわれたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

- がまんできないほどの頭痛
- 気分が悪い、吐き気がする
- 意識がもうろうとする
- 苦しいほど動悸がする
- 熱が出たり、咳が出たりする
- 鼻血が出たり、あざができやすくなる

その他気になる症状がありましたら、医師または薬剤師に相談してください。

次のような場合には、この薬を飲んでいることを医師または薬剤師にお伝えください。

- ◆ 歯を抜くなどの外科的な処置や、内視鏡検査の予定がある場合
- ◆ 別の病院などで新たにお薬を処方される場合

## ＝保管時の注意＝

この薬は、水なしでも服用できるという特性上、湿気を含みやすくなっています。

### ●保管は湿気をさけて

湿気を防ぐ容器に入れ、直射日光と湿気をさけて室温で保管してください。

### ●飲む直前に取り出す

飲む直前まで錠剤をPTPシートから取り出さないでください。

連絡先