

ダサチニブ錠「JG」 服用される患者さまへ

このお薬の服用前に必ずお読みください

患者さまやご家族の方は、このお薬の必要性や注意すべき点などについて十分理解できるまで説明を受けてください。説明に同意した場合に服用が開始されます。

以下のような症状があらわれたときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

○貧血・出血

めまい、たちくらみ、倦怠感、出血しやすくなる、血が止まりにくくなる、鼻血が出る、歯ぐきから血が出る、あざがでやすくなるなど。

○消化器症状

吐き気、嘔吐、下痢など。

○皮膚症状

発疹、皮膚のかゆみなど。

○感染症

38℃以上の発熱、せき、のどの痛み、寒気など。

○呼吸器の異常

動悸、息切れ、気を失う、胸が痛い、苦しいなど。

○尿の変化

尿量が減る、尿の出が悪くなる、血尿が出るなど。

服用中に注意していただきたいこと

- ◆ このお薬は、体調がよくなったと自己判断して服用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。必ず医師または薬剤師の指示どおりに飲み続けることが重要です。
- ◆ コップ1杯程度の水またはぬるま湯で、かまずにそのまま服用してください。
- ◆ 飲み忘れた場合は、飲み忘れた分は飲まずにとばして、次の決められた時間に1回分を服用してください。決して2回分を一度に服用しないでください。
- ◆ このお薬を服用中はグレープフルーツジュースやセイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）を含有する食品の飲食を避けてください。
- ◆ お薬の効果の確認や副作用の早期発見のため、定期的に血液検査、肝機能検査が行われます。
- ◆ 妊娠または妊娠している可能性のある人は、このお薬を服用できません。
- ◆ ほかの医療機関を受診する場合や、薬局などでほかのお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師にお伝えください。

気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先