

# 坐剤の使い方

冷所保存

〈この薬は肛門内にそう入して使用する坐剤です〉

## ◎坐剤の取り出し方


- ①1個分を切り離します。
- ②容器のあけ口の両側を左右に引きはがし、坐剤を取り出します。

## ◎そう入の仕方

- ③ティッシュやガーゼなどで坐剤の後部をつまみ、図のように先のとがった方から肛門内に深くそう入します。

中腰になって坐剤を入れた後、立ち上がれば簡単にそう入できます。


(裏面もお読みください)



## ~~~~~ ご使用の際の注意点 ~~~~~

1. この薬は飲み込んだり、口の中に入れてたりしないでください。
2. できるだけ排便後にそう入してください。
3. そう入後しばらくは異物感が残りますが、しばらくがまんすればなくなりますので心配ありません。
4. 薬が体外に出ないようにするために、そう入後20~30分は激しい運動を避けてください。
5. 乳幼児、小児の手の届かないところに保管してください。
6. 冷蔵庫などの涼しいところ(15℃以下)に保管してください。  
この薬は体温で溶けるように設計されています。高温の場所(夏場の自動車内など)では、溶解・変形する恐れがありますので、置かないでください。
7. 薬の使用中に何かいつもと違うと感じたら、直ぐに主治医又は薬剤師にご相談ください。

(表面もお読みください)

 日本ジェネリック株式会社