

ドネペジル塩酸塩「オーハラ」を 服用される方のご家族へ




1

認知症とは

認知症は老化による単なるもの忘れではありません。認知症は、記憶や判断といった脳の機能が低下し、社会生活に支障を来します。この認知症の原因となる病気の代表格はアルツハイマー病であり、他に脳卒中になると発症しやすい血管性認知症、幻視やパーキンソン症状など特徴的な症状が現れるレビー小体型認知症、若年層に発症する若年性認知症など、さまざまな病気が原因となって起こり、多彩な症状を示します。


「認知症によるもの忘れ」と 「単なるもの忘れ」との違い



社会生活に支障がある



認知症によるもの忘れ




関連した事柄を示しても思い出せない

社会生活に支障がない



単なるもの忘れ



ヒントを与えたりすると思い出せる

2

このお薬は

このお薬は、**脳において神経細胞の情報・伝達をよくするお薬です**。よくもの忘れをする、時間、日付や場所がわからなくなる、考えながら物事を進めることができなくなる、などの認知症の進行を遅らせます。このことにより、**介護者の皆さんの負担を軽くすることが期待できます**。

OD錠



錠剤



- この製品は、患者さん自身や介護されている方にも見やすく、判りやすいよう工夫しています。
- OD錠は、口の中でおおよそ30秒で形が崩れてなくなります。

3

服用にあたって

お薬の服用にあたっては、主治医の指示されることを守ってください。

1 1日1回飲ませてください。

お薬の量は主治医の指示に従ってください。

黄色の錠剤 (3mg錠) を1錠飲ませてください。

1~2週間後に白色の錠剤 (5mg錠) 1錠になります。

高度の患者さんには、白色の錠剤 (5mg錠) で4週間以上経過後、赤色の錠剤 (10mg錠) 1錠になります。

症状の進行に合わせて、お薬の量が変わります。

服用開始後にお薬の量が増えるのは、お薬を体に徐々に慣らしていくためです。

このお薬は病気そのものを完治する効果はありませんのでゆっくりではありますが、症状が進行していきます。

主治医の指示に従い、症状にあったお薬の量を飲ませてください。

3 飲み忘れても、2日分を一度に飲ませないでください。

一日程度飲み忘れても、効果に影響はありません。次の日からまたきちんと飲むようにしてください。

4 お薬を飲むことをあなたの判断で中止しないでください。

このお薬は、症状の進行を遅らせるものです。症状が良くならないようにみえても、実際には、症状の進行を遅らせていると考えられます。そのため、急にお薬をやめると、遅らせていた認知症の症状が悪化することがあります。

4

このお薬の主な副作用

服用を始めた頃

お薬の量が増えた頃

悪心・嘔吐、食欲不振、
便が軟らかくなる



イライラしたり、
ちょっとしたことで
かっとなりやすくなる



お薬に体が慣れると
消えていくこともあります

いつもと違う状態が持続したり、激しい場合には医師や薬剤師に相談してください。

患者さんの症状は、ご家族や介護者の方の適切な対応によって改善されることがあります（参照：患者さんへの対応のポイント）。

5

患者さんへの対応のポイント

認知症とは、もの忘れを主症状とする病気です。
この点を上手に利用しましょう。

よくもの忘れをする

「まだ、ごはんを食べてない」


食べたばかりなのに、食事を催促してくる。

対応のポイント

悪い例 「食べたばかりじゃないの！」

良い例 「今すぐ作るから待っててね」

待っている間に忘れてもらうのもひとつの方法であり、好きな果物やお菓子を少量出してあげるやり方もあります。



日常生活動作ができない

「箸が使えない…」

いままでできた日常の動作が、できなくなる。

対応のポイント

悪い例 「こう使うのよ！」

良い例 「スプーンで食べようか」

できないことを咎めず、できるだけ自分でしてもらえように工夫しましょう。本人に失敗を自覚させないことが重要です。



●服用時の注意

下記の場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

- 他のお薬で、皮膚などの過敏症がみられた場合
- 以前にこのお薬を飲んで、異常がみられた場合
- このお薬を過量に飲んでしまった場合
- 他のお薬を服用している場合（このお薬の効果が弱まったり副作用が出やすくなったりすることがあります。）

●生活上の注意

- アルツハイマー型認知症およびレビー小体型認知症では、自動車の運転などの機械操作能力が低下する可能性があります。また、本剤により、意識障害、めまい、眠気などがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないようにしてください。

●保管方法、その他

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。
- 廃棄する場合は受け取った薬局や医療機関に相談してください。

医療機関名 連絡先

担当医師名：

電話番号：

OHARA  大原薬品工業株式会社

〒520-3403 滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野121-15