

デュタステリドカプセル0.5mgAV「JG」

服用される患者さまへ

このお薬は、前立腺肥大症治療薬です。

特徴

- ◆ ゼラチンを主体とした「軟カプセル」です。
- ◆ 暑さや湿気に弱いため、**高温・多湿下**でこのお薬を保管した場合、カプセルが軟らかくなり（軟化）、くっつきやベタつきが生じる可能性があります。
- ◆ PTPシートに入っている場合、保管いただく環境によっては、くっつきやベタつきが生じる可能性があります。

お薬の保管と管理

- ◆ **温度と湿度にご注意ください。**
 - ◇ 高温、直射日光、湿気、水蒸気を避けて保管してください。
 - ◇ 保管場所として避ける場所
〔 例；暖房器具の周辺、窓辺、車中、洗面所など 〕
 - ◇ 涼しい室内（1～30℃）で保管してください。
 - ◇ PTPシートから取り出さずに保管してください。
 - ◇ PTPシートの小さな傷や穴あきにご注意ください。
- ◆ 皮膚から吸収されるため、**女性や小児の方は、カプセルから漏れた薬液に触れないでください。**漏れた薬液に触れた場合には、ただちに石けんと水で洗ってください。

（裏面もお読みください）

服用中の注意

- ◆ 医師の指示どおりにお飲みください。
- ◆ 以下の症状に気づいた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
 - ◇ 勃起不全
 - ◇ リビドー（性欲）減退
 - ◇ 乳房障害（女性化乳房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快感）
- ◆ 重大な副作用として「肝機能障害」や「黄疸」があらわれることがあります。
（初期症状；食欲不振、全身倦怠感、皮膚や粘膜が黄色くなる）

その他の注意

- ◆ AGA（男性型脱毛症）の医療用医薬品（飲み薬^{※1}）をお飲みになっている場合は、医師・薬剤師に必ずお伝えください。
※1；フィナステリド、デュタステリド
- ◆ 血清前立腺特異抗原^{※2}（PSA）に影響を与えるため、前立腺癌等の検査においてPSAの検査を受ける場合は、このお薬を飲んでいることを検査を行う医師にお伝えください。
※2；血清前立腺特異抗原（PSA）
前立腺癌のスクリーニングにおける重要な指標

気になることがございましたら、医師、薬剤師にご相談ください。
