



エトリアタンOD錠20mg「アメル」を 服用される方へ

このお薬は**片頭痛**のお薬です。

服用量は、主治医または薬剤師の指示を守ってください。

服用量は1回1錠まで、1日最大2錠まで。

追加服用は2時間以上あけてから

✕ ----- キリトリ ----- ✕

服用方法

- 1回1錠服用してください。
- 効果が不十分な時は、2時間以上あけてから、もう1錠追加して服用することができます。
- 1日に服用できる量は2錠までです。
- このお薬は、水なしでも服用することができます。
- 水なしで服用する場合は、お薬が口の中で吸収されることはないので、唾液で飲み込んでください。
- 水で服用する場合は、普通のお薬と同じように服用してください。



服用のタイミング

- 片頭痛が始まったら、我慢せず早めにお薬を服用してください。
- このお薬は予防薬ではありません。必ず片頭痛がおこっているときに服用してください。また、片頭痛以外の頭痛や、予防の目的では服用しないでください。



(裏面もご覧下さい。)

エトリアタンOD錠20mg「アメル」

服用記録

このお薬を飲んだ日時を記入してください。

| | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|
| 日付(月/日) | / | / | / | / | / |
| 時間(時:分) | : | : | : | : | : |
| 日付(月/日) | / | / | / | / | / |
| 時間(時:分) | : | : | : | : | : |

✕-----キトリ-----✕

他にお薬を服用している方

- 他のお薬を服用している方は、主治医や薬剤師にお伝えください。
- **薬局で買っているお薬や病院でもらっている他のお薬も、お知らせください。**

[エルゴタミン製剤、トリプタン製剤、他の頭痛薬]

このお薬とエルゴタミン製剤やトリプタン製剤と同じタイプのお薬を飲む場合は、24時間以上の間隔をあける必要があります。

服用上の注意事項

- このお薬を服用後、眠くなることがありますので、自動車の運転などの危険を伴う機械操作はしないでください。
- 今までに経験のない(いつもの片頭痛とは違う)頭痛がおこった場合は、このお薬を服用せずに、主治医にご相談ください。
- **このお薬を服用後、全く効果がない場合や不快な症状を感じた場合には、それ以上このお薬を服用せず、主治医にご相談ください。**
- **いつもと違う症状がおこったら、主治医や薬剤師にご相談ください。**



共和薬品工業株式会社

2018年12月作成
02ELT*S01H01