


エピナスチン塩酸塩 点眼液0.05%「TS」 を使用される患者さんへ



このお薬は

- アレルギー性結膜炎の治療に用いられます
- 1回1滴、1日4回(朝、昼、夕方及び就寝前に)点眼してください



点眼方法

- 1 点眼前には手をきれいに洗ってください。
- 2 容器の先が目やまぶた、まつ毛に触れないように点眼してください。
- 3 点眼後は目を閉じて、目頭を1～5分間軽く押さえてください。



薬液が目のまわりに
ついたときは

ティッシュか
清潔な
タオルで
ふきとる



目頭を押さえることで
薬液が鼻などに
流れ込むのを
防ぐことが
できます



点眼時の注意

- 必ず、指示された使用方法、使用期間をお守りください。
- 他の点眼液も使用している場合には、少なくとも5分以上は間隔をあけてから点眼してください。

点眼液の保管に関する注意

- 付属の投薬袋に入れ、高温や直射日光を避けて室温(1～30℃)で保存してください。
- 子供の手が届かないところに保管してください。
- 開封後4週間を経過した場合は、残りの点眼液を使用しないでください。

その他の注意

- 点眼後、しみるなどの自覚症状が続く場合は、医師の診察を受けるようにしてください。

その他、点眼後に異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

販売元



日本ジェネリック株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

製造販売元



テイカ製薬株式会社
富山市荒川一丁目3番27号

EPNAO-PG01
2021.06