

エゼアト配合錠「JG」 服用される患者さまへ

このお薬は、血液中のコレステロールを低下させる2つの有効成分（エゼチミブ、アトルバスタチン）が配合されています。

副作用について

- ◆ エゼアト配合錠の服用によって、エゼチミブとアトルバスタチン両剤の副作用が出る場合があります。
主な副作用として、腹部膨満、便秘、胃炎などが報告されています。
- ◆ 重大な副作用として、ごくまれに**横紋筋融解症※**が起これることが知られています。
次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性がありますので、直ちに服用をやめて、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

○筋肉が痛い

○手足の力が入らない

○尿の色が濃い（赤褐色になる）

※横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分（ミオグロビン）が血液中に流れ出る病気です。

赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全（腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる）になることもあります。

服用時の注意

まれに下記のような症状があらわれ、〔 〕内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、直ちに服用をやめて、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- ◆ 筋肉の痛み、手足のこわばり、赤褐色尿〔横紋筋融解症、ミオパチー、免疫介在性壊死性ミオパチー〕
- ◆ 吐き気・嘔吐、からだがだるい、皮膚や白目が黄色くなる〔劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸〕
- ◆ 意識がうすれる、発疹、じんましん、発熱、息苦しい、さむけ、ふらつき、かゆみ、判断力の低下、考えがまとまらない、口唇周囲のはれ、汗をかく〔過敏症〕
- ◆ せき、血の混じった痰、息苦しい、息切れ、発熱〔間質性肺疾患〕
- ◆ のどの渴き、尿の量が増える、からだがだるい〔高血糖、糖尿病〕
- ◆ のどの痛み、動悸・息切れ、鼻血・歯ぐき・皮下の出血〔無顆粒球症、汎血球減少症、血小板減少症〕
- ◆ 発熱、食欲不振、赤い発疹〔中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑〕

気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先