

ファミシクロビル錠250mg「JG」

服用される患者さまへ

このお薬は、単純疱疹と帯状疱疹の原因となるウイルスの増殖を抑えます。

効果があらわれるまでに少し日数がかかることがあります。ご自身の判断で飲む量の加減や中止をせず、担当医師の指示通りに服用してください。

服用開始前

次の方は担当医師または薬剤師にお申し出ください。

- ◆ 腎臓に障害のある方、透析を受けている方
(お薬の量の調節が必要な場合があります)
- ◆ 妊婦または妊娠している可能性のある方
- ◆ 授乳中の方
- ◆ 他のお薬を使用している方、新たに使用する方

服用中

◇ 次のような症状があらわれた場合は、すぐに受診してください。

◆考えがまとまらない ◆判断や考えがおかしくなる ◆幻覚・幻聴
(ないものが見えたり、誰もいないのに話し声や物音が聞こえたりする) ◆意識がなくなる ◆高熱 ◆まぶたや眼の充血 ◆唇や口内のただれ ◆紅斑 ◆尿量減少 ◆むくみ ◆全身がだるい ◆手足・肩・腰などの筋肉痛 ◆脱力感 ◆赤褐色尿

- ◇ 自動車の運転などの危険を伴う機械の操作を行う場合には、十分に注意してください。
(意識障害(気を失う・もうろう状態)があらわれることがあります)

気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。