

ファムシクロビル錠 250mg「JG」

再発性の単純疱疹（口唇ヘルペスまたは性器ヘルペス） の治療を受けられる方へ

次のような再発の初期症状があらわれた場合、症状発現後すみやかに（6時間以内）お薬を服用してください。

- ☐ 痛み（チクチク・ヒリヒリなど）
※ただし、性器ヘルペスの排尿時の痛みは含まない。
- ☐ むずむずするような違和感
- ☐ かゆみ
- ☐ 腰の痛みや違和感（性器ヘルペスの場合）

これらは、単純疱疹の再発時に一般的にみられる症状です。

- ☐ 医師の指示どおりに、お薬を服用してください。
2回服用指示の場合、1回目の服用から約12時間後に2回目を服用してください。なお12時間後が就寝中の場合は6～18時間後の範囲で就寝前または起床後に服用してください。
※お身体の状態により1回服用指示の場合もあります。
- ☐ 再発の初期症状出現後速やかに服用できるよう、お薬は常に携帯してください。

ウラ面もお読みください▶

- 妊娠中または妊娠している可能性がある方、授乳中の方は、お薬を服用せずに処方された医師に相談してください。
- 服用中、服用後に気になる症状があらわれた場合や異常（症状の増悪を含む）を感じた場合は、放置せず、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- 再発の初期症状出現後6時間以内にお薬を服用できなかった場合で、治療を希望される方は、医療機関を受診してください。

お薬の保管に関する注意

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光を避けて室温（1～30℃）で保管してください。光により淡い黄色等に変色することがあります。変色したお薬は、服用しないでください。
- お薬は湿気を避けて保管してください。
- 使用期限を過ぎたお薬は服用しないでください。

このほかにも気になることや、わからないことがある場合は
医師または薬剤師に相談してください。

販売元

日本ジェネリック株式会社

製造販売元

ダイト株式会社