痛風・高尿酸血症で

フェブキソスタット錠「JG」を服用される患者さまへ

このお薬は、血液中の尿酸の濃度（尿酸値）を下げるお薬です。
痛風や高尿酸血症の治療に用いられます。

このお薬の飲み始めに、痛風発作が起こることがありますが、そのままお薬を飲み続けてください。

血液中の尿酸の濃度が急激に下がると、関節などに沈着していた尿酸の結晶が一気に溶け始め、それがきっかけで痛風発作が起こることがあります。
痛風発作が起きたときに尿酸値を下げるお薬を急にやめると、かえって発作がひどくなる場合がありますので、そのままお薬を飲み続けてください。
痛風発作の治療については、医療機関を受診いただくか、あらかじめ指示された痛み止めなどを併せてお飲みください。

次のような症状が急にあらわれたときは、服薬をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ◆ 全身がだるい、食欲がない、皮膚や白目が黄色くなる
- ◆ 全身の皮疹や発疹

（裏面もお読みください）

主な副作用

- ◆ 関節痛、四肢不快感、四肢痛
- ◆ 下痢
- ◆ 倦怠感

このほかにも気になる症状があらわれた場合には、医師または薬剤師にご相談ください。

服用時の注意

- ◆ 飲み忘れた場合は、気がついたとき、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の通常の服用時間が近い場合は1回とばして、次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。その場合、2回分を一度に飲まないでください。
- ◆ このお薬は、尿酸値をゆっくり下げるために、少ない量から開始し、目標の尿酸値に下がるまで段階的にお薬の量を増やしていくお薬です。自己判断でお薬をやめたり、量を変更したりすると、症状の悪化や再発につながります。指示された量を守り、毎日きちんと飲み続けましょう。
- ◆ 医師の指示に従い、定期的に受診してください。痛風や高尿酸血症の治療は継続することが大切です。定期的に診察を受けながら、根気よく治療を続けましょう。

気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

日本ジェネリック株式会社

FEBUX-PG-1JG
2022.06