

フルボキサミンマレイン酸塩錠「CH」

お飲みになる患者さま、ご家族の方へ

1 お薬を正しく飲むために

効果があらわれるまでに時間がかかります。

このお薬は、飲みはじめは、すぐに効果はあらわれませんが、飲み続けると、脳内に作用し、脳内の神経伝達をスムーズにし、抑うつ気分や不安を和らげます。

効果があらわれるまで1～2週間かかることが多いため、すぐに効果があらわれないからといって、勝手に飲むのをやめてしまわないように注意しましょう。

症状がよくなっても、医師の指示どおり続けましょう。

うつ病は再発・慢性化しやすいため、症状がよくなってもお薬を飲み続けることが大切です。症状がよくなったからといって、量を減らしたりしないようにしましょう。

【飲み忘れた場合の対応】

できるだけ早く1回分を飲んでください。 次の飲む時間が近い場合1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。決して2回分を1度に飲んではいけません。

2 お薬を飲んでいる間の注意事項

急に量を減らしたり、使用を中止した場合に頭痛、吐き気、めまいなどの症状があらわれることがあります。

このお薬の使用を中止する場合には、時間をかけて、少しずつ量を減らしていきます。体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を減らしたりせず、医師の指示どおりに使用してください。

うつ病やうつ状態の人は死んでしまいたいと感じることがあります。

このお薬を飲んでいる間、特に飲みはじめや飲む量を変更した時に、不安感が強くなり死にたいと思うなど症状が悪くなることがあるので、このような症状があらわれた場合には、医師に相談してください。



次の症状があらわれることがあります。

不安になる、いらいらする、あせる、興奮しやすい、発作的にパニック状態になる、ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来す、敵意を持つ、攻撃的になる、衝動的に行動する、じっとしていることができない、などの症状があらわれることがあります。このお薬との関連性は明らかではありませんが、これらの症状があらわれた人の中には、うつ症状などのもととある病気の症状が悪化する場合は、死んでしまいたいと感じたり、他人に対して危害を加えたりする場合があります。

病状に変化があったと感じた場合には、医師に相談してください。また、ご家族の方にも伝えるようにしてください。

眠気・意識の低下などの症状があらわれることがあります。

眠気や意識の低下があらわれたり、意識がなくなることがあるため、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。

3 ご家族の方へ

患者さんの状態の変化について観察し、見守ってください。

ご家族の方は、死にたいという気持ちになる、興奮しやすい、攻撃的になる、ちょっとした刺激で気持ちの変調を来すなどの患者さんの行動の変化やうつ症状などのもととある病気の症状が悪化する危険性について医師から十分に理解できるまで説明を受けてください。

もし「死にたい・・・」など、自殺をほのめかすような発言があった場合は、すぐに医師に相談してください。特に、症状がある程度回復して気力が戻ってきたときが、もっとも危険な時期です。それとなく注意して見守ってください。

18歳未満の方・ご家族の方へ

このお薬の類薬において、18歳以下の大うつ病性障害のある人に有効性が確認できなかったという報告があります。18歳未満の大うつ病性障害のある人は、医師と十分に相談してください。

24歳以下の方・ご家族の方へ

24歳以下で抗うつ剤を使用した場合、死んでしまいたいという気持ちを強めるという報告があります。24歳以下でこのお薬を使う人は医師と十分に相談してください。

医療機関名 / 連絡先

