

ガランタミンOD錠4mg・8mg・12mg「JG」 服用される患者さまとご家族の方へ

このお薬は、認知症症状の進行を遅らせるお薬です。

1回4mg（1日2回）から飲み始め、からだをお薬に慣らしていきます。

服用中の注意 ①

- ◆ 次の症状があらわれた場合は、主治医にご連絡ください。
 - ◇ 吐き気
 - ◇ 食欲の低下
 - ◇ 便が軟らかくなる・下痢
 - ◇ 頭痛
 - ・ からだがお薬に慣れると、一般的には症状は消失しますが、症状が継続する場合は主治医にご相談ください。
 - ・ 飲み始めたころやお薬の量が増えたころに出やすい症状です。
 - ・ 一般に、吐き気などの消化器症状は、食後に飲むことで軽減される可能性があります。
- ◆ 重大な副作用として、「徐脈」、「心ブロック（めまい、気を失う）」、「QT 延長（動悸、気を失う）」などがあらわれることがあります。特に心臓病（心筋梗塞、弁膜症、心筋症など）の人や電解質異常（低カリウム血症など）のある人ではご注意ください。異常を感じたら、ただちに受診してください。
- ◆ めまい、眠気がおこることがあります。また、アルツハイマー型認知症では運転能力や機械操作能力が徐々に低下することがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に注意してください。特に、飲み始めから数週間ご注意ください。

（裏面もお読みください）

服用中の注意 ②

- ◆ 主治医の指示に従って、毎日決められた量をお飲みください。
- ◆ 飲み忘れても、2回分を一度に飲まないでください。
飲み忘れにすぐ気づいたとき
…できるだけ早く1回分をお飲みください。
数時間たって気づいたとき
…次の通常の服用時間に1回分お飲みください。
- ◆ 決められた量よりも多く飲んでしまった場合は、すぐに主治医にご連絡ください。
- ◆ 他のお薬といっしょに飲む場合、組合せによってお薬の作用が強く出たり、弱まったりすることがあります。
- ◆ 他にお飲みのお薬がありましたら、主治医にお伝えください。

お薬の保管と管理

- ◆ ご家庭でのお薬の管理は、ご家族や介護の方が行うようにしてください。
- ◆ 子供の手の届かないところに保管してください。

気になることがございましたら、医師、薬剤師にご相談ください。