

ヘリコバクター・ピロリ除菌療法 を受けられる患者さんへ

胃潰瘍や十二指腸潰瘍が再発する原因の一つである、ヘリコバクター・ピロリ菌を取り除く治療を「ヘリコバクター・ピロリ除菌療法」といいます。

1回分として、2種類の抗菌薬と胃酸の分泌を抑える薬の3剤を同時に服用してください。

1日2回(朝・夕)、7日間続けて服用してください。

この治療法はこれらの薬を主治医の指示どおりに正しくのみ続けることが重要です。

服用中は以下の点にご注意ください。

- これらの薬をのむと主に軟便、下痢などの消化器症状や味覚異常又は発疹等の過敏症がでることがあります。

症状に応じて次のようにしてください。

軟便、軽い下痢や味覚異常の場合

自分の判断で薬をのむ量や回数を減らしたりせず、残りの薬を最後まで(7日間)のみ続けてください。

ただし、症状がひどくなった場合は、主治医又は薬剤師に相談してください。

発熱、腹痛を伴う下痢、あるいは下痢に粘液や血液が混ざっている場合、又は発疹等の過敏症の場合

直ちに薬をのむことを中止し、主治医又は薬剤師に連絡してください。

- その他、気になる症状がある場合は、主治医又は薬剤師に相談してください。

(裏面もご覧ください)

(1) ヘリコバクター・ピロリ除菌療法とは



胃潰瘍や十二指腸潰瘍が再発する原因の一つに、ヘリコバクター・ピロリという胃内に存在する細菌が関係することが明らかになっています。

2種類の抗菌薬と胃酸の分泌を抑える薬を服用することにより、この細菌を取り除く治療を「ヘリコバクター・ピロリ除菌療法」といいます。

(2) ピロリ菌を除去するメリットは

ヘリコバクター・ピロリの除菌に成功すると、胃潰瘍や十二指腸潰瘍が再発しにくくなることがわかっています。

《服薬チェック表》 正しく服用できた時は○印をつけてください。

月/日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
/	/	/	/	/	/	/	/
 朝							
 夕							

ご連絡先: