

イマチニブ錠100mg「JG」 服用される患者さまへ

このお薬の服用前に必ずお読みください

患者さまやご家族の方は、この治療の必要性や注意すべき点などについて十分理解できるまで説明を受けてください。説明に同意した場合に服用が開始されます。

以下のような症状があらわれたときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- 発熱・悪寒
- 下血、吐血、腹痛、腹部膨満感
- 頭痛、めまい、ふらつき
- 吐き気、嘔吐
- 急激な体重増加、浮腫（むくみ）
- 皮膚のかゆみ・発疹
- 筋肉の痛み
- 呼吸困難、息苦しい
- 出血しやすい、出血が止まりにくい
- 貧血

裏面もお読みください

服用中に注意していただきたいこと

- ◆ このお薬は、体調がよくなったと自己判断して服用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。必ず医師または薬剤師の指示どおりに飲み続けることが重要です。
- ◆ 胃などの負担を軽くするため、食後に多めの水またはぬるま湯で服用してください。
- ◆ 飲み忘れた場合は、飲み忘れた分は飲まずにとばして、次の決められた時間に1回分を服用してください。決して2回分を一度に服用しないでください。
- ◆ このお薬を服用中はグレープフルーツジュースやセイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）を含有する食品の飲食を避けてください。
- ◆ お薬の効果の確認や副作用の早期発見のため、定期的に血液検査、肝機能検査、腎機能検査が行われます。
- ◆ めまい、眠気、目がかすれるなどの症状があらわれることがあるので、高いところでの作業や自動車の運転など危険を伴う機械を操作するときには十分に注意してください。
- ◆ 妊娠または妊娠している可能性のある人は、このお薬を服用できません。
- ◆ ほかの医療機関を受診する場合や、薬局などでほかのお薬を購入される場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師にお伝えください。

連絡先（医療機関・薬局）