




# 硝酸イソソルビドテープ40mg「東光」 をご使用される方へ

硝酸イソソルビドテープ 40mg「東光」は胸などの皮膚から成分が吸収されることで効果を示す心臓病の薬です。医師の指示に従って、正しく貼付してください。

## 硝酸イソソルビドテープ40mg「東光」を貼る場所について

- 医師の指示に従って、胸部、上腹部又は背部のいずれかに貼ってください。
- 自動体外式除細動器 (AED) の妨げにならないように貼付部位を考慮してください。AED 電極パッドの貼付部位は、右下図の様に『右鎖骨すぐ下』と『左鎖下の肋骨最下部』の位置の2箇所になります。



## 貼るときの注意について



- 貼る場所をよくふいて水分や汗を取り除き貼ってください。
- 新しい薬に貼り替える時は前回と違う場所に貼ってください。
- シワができないように貼ってください。  
シワができたときは、シワを伸ばし貼り直しをしてください。
- 発赤、かゆみ、かぶれ等が出た場合には、医師にご相談ください。
- アルミ袋開封後は早めにご使用ください。
- 貼り忘れがないようにしてください。

## 重要な注意事項

- 硝酸イソソルビドテープ 40mg「東光」は医師の指示通りにご使用ください。
- 主に勃起不全治療等に用いられる以下の薬剤は絶対に併用しないでください。  
バイアグラ・レビトラ・シアリス・レバチオ・アドシルカ・ザルティア・アデムパス

# 硝酸イソソルビドテープ40mg「東光」の貼り方

アルミ袋の左上・右下にある切り口より開けて取り出してください。尚、貼る部位に汗や汚れなどがみられるときは、清潔なタオル等でよくふいてください。




1

印刷面を上にして山折りにし左手で(1)の部分を持って、右手で(2)の透明フィルムを全てはがします。



2

(2)の部分の粘着面を医師に指示された部位へ貼ります。



3

残った(3)の透明フィルムを再度、山折りにししっかりと矢印の方向へはがします。



4

シワや空気が入らないように、上からしっかりと押さえてください。