

ラタチモ[®]配合点眼液「ニッテン」を使用される患者さまへ

使用する際に注意すること

このお薬は5mLの容器に2.5mL入っています。
薬液が少なく見えますが、治療に必要な量は十分入っています。

点眼前 手をきれいに洗ってください。

点眼時 1日1回、1滴の点眼です。
決められた点眼回数をお守りください。

※点眼後は目を閉じて、目頭(涙嚢部)を1～5分間、指で軽く押さえてください。
※他の点眼薬も使用する場合には、5分間以上あけてから点眼してください。

点眼後

- ・点眼後、目からあふれた点眼液を皮膚についたまま放置しつづけると、少しずつ目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長く、太くなることがあります。
- ・点眼液が目まわりについたときは、すぐにぬらしたティッシュやタオルでふき取るか、目を閉じて洗顔してください。洗顔前や入浴前に点眼することもおすすめです。



この点眼液は緑内障・高眼圧症を治療するお薬です。

- ・ラタノプロスト
 - ・チモロールマレイン酸塩
- 2つの薬を配合しています。



ラタチモ[®]配合点眼液「ニッテン」を使用される患者さまへ

点眼液の保管・取扱いで注意すること

- ・ 開封前は冷蔵庫(2～8℃)で保管してください。
- ・ 開封後は投薬袋に入れて室温(1～30℃)で保管することもできます。
(冷蔵庫での保管も可能です)。
- ・ 開封後は、専用の投薬袋に入れてご使用ください。
- ・ 開封後は4週間以内に使用し、残液は使用しないでください。

ラタチモ[®]配合点眼液「ニッテン」の副作用について

- ・ 以下のような症状がある場合には、医師の診察を受けるようにしてください。
 - ▶ まつ毛が伸びる
 - ▶ 息切れ、息苦しさ
 - ▶ 目のまわりが黒ずむ
 - ▶ 脈が乱れる
 - ▶ 瞳の色が濃くなる
 - ▶ 目のまわりの腫れや赤み、かゆみなど
 - ▶ 充血、眼の痛み、刺激、異物感

その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。