

ラタノプロスト点眼液0.005%「CH」

をお使いの患者さまへ

緑内障、高眼圧症のお薬です。

=点眼方法・点眼時の注意=

1回1滴、1日1回点眼します。

1. 点眼前に、手をせっけんでよく洗ってください。
2. 容器の先が直接目に触れないように、点眼してください。
3. 点眼後は、目を軽く閉じて、約3分間目頭の下を指で押さえてください。



- ◇ 他の点眼液を使用する場合は、5分間以上の間隔をあけて点眼してください。
- ◇ このお薬は、コンタクトレンズを変色させることがあります。コンタクトレンズをつけている場合には、レンズをはずしてから点眼し、15分以上経過してからレンズをつけてください。
- ◇ 点眼後、目のまわりに溢れた液をふき取らずにそのままにしておくと目のまわりが黒ずんだり、まつげが濃く、太くなったりすることがありますので、すぐに濡らしたガーゼやティッシュでふき取るか、目を閉じて洗顔してください。

(裏面もご覧ください)

=点眼後の注意=

- ◇ このお薬を使用した場合、人によっては瞳の色が濃くなる場合があります。
- ◇ 目が赤くなる場合がありますが、多くの場合、点眼を継続すると症状は軽減します。ご自身の判断で点眼を中止しないでください。
- ◇ しみる、かゆみ、痛みなどの症状が続く場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- ◇ 一時的に目がかすむことがあるため、症状が回復するまで自動車等の運転や、機械類の操作はしないでください。

=保存方法=

- ◇ 開封後は専用の袋に入れ、光を避けて室温（1～30℃）で保存してください。
- ◇ 開封後4週間経過した場合は、残った点眼液を使用しないでください。