

レボフロキサシン錠 500mg「CH」

レボフロキサシン錠 250mg「CH」

服用される患者さまへ




指導箋は1枚ずつ切り取って患者さまにお渡しください

レボフロキサシン錠 500mg「CH」 レボフロキサシン錠 250mg「CH」 ご使用になれる先生方へ

本剤は、PK/PD理論※に基づいた適正使用の観点から、「治療効果の向上」及び「耐性菌の出現抑制」を目指し、レボフロキサシンとして1回500mg、1日1回の用法用量が設定されています。

患者さまには、主治医に指示された用量を1日1回正しく服用するようお伝えください。

※薬物動態学(Pharmacokinetics)/薬力学(Pharmacodynamics)理論とは、薬物動態学と薬力学の双方から、薬剤の適正な投与量・回数を設定する考え方。



本剤は濃度依存性に殺菌効果を示す抗菌薬であるため、Cmax(最高血中濃度)を上げることで治療効果の向上が期待できる薬剤です。

レボフロキサシン錠 500mg 「CH」

レボフロキサシン錠 250mg 「CH」

服用される患者さまへ

このお薬は感染症の原因である細菌の増殖をおさえ、殺菌する作用があります。

本紙をよくお読みいただき、正しく服用してください。

＜服用にあたってのお願い＞

主治医または薬剤師の指示を守り服用してください。このお薬は **1日1回** 服用することで、感染症の原因菌を速く消失させ、症状を早く改善することが期待できます。

服用は

1日1回です。

必ず守ってください！



＜服用にあたっての注意事項＞

- 抗菌薬は主治医または薬剤師の指示どおりに服用しなかった場合、感染症が治らなかったり、次に感染症にかかったときに治りにくくなる可能性があります。
- 飲み忘れに気づいた場合、できるだけ早く服用してください。ただし、次の服用時間に近い場合は、忘れた分は服用せず、次の服用時間に服用してください。

絶対に2回分をまとめて1度に服用しないでください

- 誤って多く服用した場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- 主治医または薬剤師の指示なしに、自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止しないでください。

お薬についてわからないこと、服用中に気になる症状がみられましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

主治医または薬剤師の連絡先



製品に関するお問合せ先
日本ジェネリック株式会社 お客様相談室

受付時間：9時～18時(土、日、祝日を除く)
TEL 0120-893-170 FAX 0120-893-172