

劇薬 処方箋医薬品*


尋常性乾癬等 角化症治療剤

マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「CH」

マキサカルシトール製剤

※注意－医師等の処方箋により使用すること

使用される患者さまへ



マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「CH」 使用される患者さまへ

使用方法

- 通常1日2回適量を患部にすり込みますが、症状により適宜回数を減らされることがあります。

必ず指示された使用方法に従ってください。

- お薬を一旦指先に出し、量を確認してから塗ってください。
- **1日の使用量が10gを超えないよう注意してください。**

※同じ成分を含む他の剤形（ローション等）のお薬を使う場合、使用量は合計して10gまでです。

あなたのご使用方法

<医師・薬剤師記入欄>

マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「CH」


g



同じ成分の他剤形のお薬（ローション等）

g

≦10g



使用量の目安

一般的に、外用剤を大人の両方の手のひらの面積に塗る最適な量は約0.5gです。本剤（10gチューブ）の場合、大人の人差し指の第一関節の1.5倍の長さに出した量が約0.5gです。

次の方は必ず医師または薬剤師にご相談ください。

- 骨粗しょう症など他の治療を受けている方
- 他のお薬を使用している方（薬局で購入したお薬も含む）
- 健康補助食品を使用している方
- 腎臓の病気がある・腎機能が低下している方
- 高カルシウム血症の方
- 妊娠中・妊娠している可能性がある／授乳中の方
- 以前にお薬を飲んで、かゆみ、発疹などが出たことがある方



（裏面もお読みください）

このような症状に気づいたら

お薬の使用をやめて、ただちに医師または薬剤師にご相談ください。

- 食欲がない
- のどや口が渇く
- 頭痛がする
- めまいがする
- 体がだるい、しびれる
- 吐き気がする
- お腹が痛い
- 体がむくむ
- いつもと違う感じが続く



※他にも気になる症状があらわれましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

その他の注意

- 患者さまによっては血液中のカルシウム濃度や腎機能等の検査を定期的に行う場合があります。医師の指示に従い検査を受けてください。
- 指示された部分以外には使用しないでください。
- お薬を塗った後は手をよく洗ってください。お薬を使った手で目や傷口などにふれないように注意してください。
- このお薬を他の人にあげないでください。
- 乳幼児、小児の手の届かないところで保管してください。
- キャップをしめて、直射日光、高温を避け室温で保管してください。

〈連絡先〉



製品に関するお問い合わせ先

日本ジェネリック株式会社 お客様相談室

受付時間：9時～18時（土、日、祝日を除く）
TEL 0120-893-170 FAX 0120-893-172