

# メマンチン塩酸塩OD錠5mg・10mg・20mg「JG」 服用される患者さまとご家族の方へ

このお薬は、認知症症状の進行を遅らせるお薬です。  
1日1回5mgから飲みはじめ、からだをお薬に慣らして  
いきます。

## 飲み始めに起こりやすい症状

- ◆ めまい
- ◆ 眠くなる

症状がひどい場合や、他にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

## 服用中の注意①

- ◆ この薬によるめまい、傾眠や、アルツハイマー型認知症でも自動車の運転などの機械操作能力が低下することがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。
- ◆ 症状に変化がないように見えるとき  
変化がないように見えても、実際は症状の進行を遅くしていると考えられますので、ご自分やご家族の判断で服用をやめたり、お薬の量を加減したりしないでください。

(裏面もご覧ください)

## 服用中の注意②

- ◆ 飲みはじめるときは、体を慣らすために、通常1週間ごとに、お薬の量が増えていきます。  
医師または薬剤師に従って、決められた量をお飲みください。
- ◆ お薬の量を増やすのは、症状が悪化したからではありません。
- ◆ 効果を十分に得るために、服用時間を決め、毎日その時間に規則正しくお飲みください。  
食事の時間にかかわらず服用できます（食前,食後,食間）。
- ◆ 飲み忘れに気づいたときでも、次の日から決められた時間に飲んでください。2日分を一度に飲まないでください。
- ◆ 間違えてたくさん飲んでしまい、いつもとは違う様子が見られた場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

## お薬の保管

- ◆ 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところで、直射日光と湿気を避けて室温で保管してください。

気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先（医療機関・薬局）