


# ミグリトール錠 25mg/50mg/75mg 「JG」

## 服用される患者さまへ

このお薬は食後の血糖上昇を緩やかにし  
食後の高血糖を改善するお薬です。



(実寸ではありません)

### 服用時の注意

- ◆ このお薬は**必ず食事の直前**に飲んでください。
- ◆ もし、食事前に飲み忘れ、食事中または食直後に気付いたときはすぐにお飲みください。

### 服用中の注意

- ◆ **低血糖**症状が（脱力感、強い空腹感、冷や汗、動悸（どうき）、手足のふるえ、意識がうすれる）あらわれる場合があります。このような症状があらわれた場合は、ブドウ糖を飲んでください。
- ◆ **高所作業や自動車の運転等危険を伴う作業に従事しているときに、低血糖症状を起こすと事故につながります。特に注意してください。**
- ◆ このお薬を飲むと、おなかが張る、おならの回数が増える、おなかが緩くなるなどの**消化器症状**が起こることがあります。
- ◆ 授乳をさけてください。

(裏面もご覧ください)

# 低血糖症状について

## ■ 低血糖症状とは

血液中の糖分が少なくなり過ぎた状態で、急に強い異常な空腹感、力のぬけた感じ、発汗、手足のふるえ、眼のちらつき等が起こったり、また頭が痛かったり、ぼんやりしたり、ふらついたり、いつもと人柄が違ったような異常な行動をとることもあります。

症状が重い場合には、けいれんを起こしたり意識を失うこともあります。空腹時に起こり、食べ物をとると急に良くなるのが特徴です。

## ■ 低血糖症状が起こったら

- ・ 低血糖症状がもし起こったら**落ち着いてすぐブドウ糖を飲んで**安静にしてください。普段から10～15gのブドウ糖を持ち歩き、すぐその場でブドウ糖をとることが必要です。
- ・ 低血糖症状を起こした場合は、必ず早めに主治医に報告してください。

## ■ 低血糖症状を起こさないために

- ・ 低血糖症を予防するためには、お薬の量や飲み方は主治医の指導を守り、また食事療法・運動療法はきちんと守ることが大切です。
- ・ 食事時刻の遅れ、激しい運動、空腹時の運動は避けるようにしましょう。

症状が気になるなど、わからないことがある場合は医師または薬剤師にご相談ください。