

プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg/0.5mg [JG]

服用される患者さまへ

突発的睡眠、傾眠について

服用すると突然眠くなったり、前兆もなく急に眠り込んでしまうこと、めまいや立ちくらみ、ふらつき、失神があらわれることがあります。

自動車の運転や危険をともなう機械の操作、高い所での作業などはしないでください。



自動車の運転



危険をともなう
機械の操作



高い所での作業

衝動制御障害について

社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い物を繰り返したり、病的に性欲や食欲が亢進したりする（病的賭博、病的性欲亢進、強迫性購買、暴食等）ことがあります。

このような症状があらわれた場合には、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。


このお薬を正しく服用するため、 飲む前に必ずお読みください。

- ◆このお薬は、パーキンソン病や特発性レストレスレッグス症候群(下肢静止不能症候群)の治療に使われるお薬です。
- ◆飲み方は、必ず主治医の指示に従うようにし、自身の判断で飲む量を変えたり、飲むのをやめたりしないでください。お薬の量を勝手に調節したり服用を中止したりすると、症状が悪化したり副作用があらわれたりすることがあります。
- ◆気になる症状があらわれた場合には、主治医または薬剤師にご相談ください。

この説明書には特に注意していただきたいことだけが書いてあります。

このお薬について何かわからないことがありましたら、主治医または薬剤師にご相談ください。

このお薬に関するお問合せ<お客さま相談室>

 0120-893-170 (9時~18時 土、日、祝日を除く)

 日本ジェネリック株式会社