

プレガバリンOD錠25mg・75mg・150mg「JG」 服用される患者さまとご家族の方へ

- ・このお薬は、神経の痛みに対するお薬です。
- ・痛いときにだけ服用するのではなく、一定期間服用を続けることで効き目を発揮します。
- ・少しずつ用量を増やしていきます。
- ・効き目があらわれるまで、一般的な痛み止め（消炎鎮痛剤など）よりも時間がかかることがあります。
- ・痛みが軽減してきたら医師と相談のうえ、お薬の量を減らしたり、やめたりすることも可能です。
- ・お薬の量や服用方法などについては、ご自分で判断せず、必ず医師の指示に従ってください。

服用中の注意①

次のような症状があらわれることがあります。

- ◆ めまい
- ◆ 眠くなる
- ◆ 意識消失

- ・特に高齢の方は、これらの症状により転倒し骨折などを起こす危険があるため、十分にご注意ください。
- ・服用中は事故の危険がありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。

(裏面もご覧ください)

服用中の注意②

- ◆ 人により体重が増えることがありますので、気になる徴候があらわれた場合には、ご相談ください。
- ◆ 腎臓が悪い方、透析をうけている方、心臓が悪い方、妊娠中または授乳中の方は、必ずご相談ください。
- ◆ ほかにお薬を服用している場合（薬局で買ったお薬も）、必ずお伝えください。
- ◆ アルコールはお薬の作用を強めることがありますので、ご注意ください。
- ◆ 誤って多く服用した場合はご相談ください。
- ◆ ご自分の判断で服用を中止したり、服用量や服用回数を変更せず、必ず医師にご相談ください。
- ◆ 服用を急に中止すると、眠れなくなる・吐き気がする・頭痛・下痢などの症状があらわれることがあります。
- ◆ 服用をやめるときは、1週間以上かけて、徐々に量を減らしていきます。必ず医師と相談しながら進めてください。

気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先（医療機関・薬局）