

プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mg/1.5mgMI「JG」

服用される患者さまへ

このお薬を服用中は、自動車運転や機械の操作、高い所での作業など危険を伴う作業はしないでください。



自動車の運転



危険をともなう
機械の操作



高いところでの作業

- 服用すると、前兆のない突発的睡眠(前兆のない急な眠り込み)や傾眠(眠気でぼんやりする)があらわれることがあります。
- 服用後、自動車を運転し、突発的睡眠などにより自動車事故を起こした例が報告されています。
- 突発的睡眠を起こした症例には、傾眠や過度の眠気のような前兆を認めなかった例や、服用開始後1年以上経過した後に初めてあらわれた例もあります。

このお薬を正しく服用するため、 飲む前に必ずお読みください。

衝動制御障害について

社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い物を繰り返したり、病的に性欲や食欲が亢進したりする(病的賭博、病的性欲亢進、強迫性購買、暴食等)ことがあります。

このような症状が現れた場合には、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

飲み方は、必ず主治医の指示に従うようにし、自身の判断で飲む量を変えたり、飲むのをやめたりしないでください。お薬の量を勝手に調節したり服用を中止したりすると、症状が悪化したり副作用があらわれたりすることがあります。

この説明書には特に注意していただきたいことだけが書いてあります。このお薬について何かわからないことがありましたら、主治医または薬剤師にご相談ください。

連絡先