

# クエチアピン錠「JG」

## 服用される患者さまとご家族の方へ

25mg



100mg



200mg



このお薬の服用中に、体重増加や、血糖値の上昇がみられることがあります。

そのため、**糖尿病の方、糖尿病と言われたことのある方**は、このお薬を服用することはできません。

お心当たりのある方は、必ず服用される前に主治医もしくは薬剤師にご相談ください。

また、**ご家族に糖尿病の方がいる方、血糖値が高いと言われたことのある方、肥満傾向の方、体重が増加してきた方**は、糖尿病になりやすいので、服用される前に必ず主治医もしくは薬剤師にご相談ください。

服用されている間は、**特に血糖値と体重の変化に気をつけてください**。定期的に血糖値等を測定する場合があります。

(裏面もお読みください)

次の症状があらわれた場合は、服用をやめて、ただちに主治医に連絡し、診察を受けてください。

- ◇ 急に体重が減ってきた
- ◇ 激しくのどが渇く
- ◇ トイレの回数が多くなる
- ◇ 尿の量が増える

上記の症状は血糖値が高くなった時に、あらわれる場合があります。

そのまま放置しておくと、倒れてしまうことがあります。

糖分を含む飲料水（ジュース、炭酸飲料、スポーツドリンクなど）を急にたくさん飲むと、血糖値が急激に上昇する可能性があります。

激しいのどの渇きがある場合は、**糖分を含む飲料水を飲むのをやめて**、すぐに主治医に連絡してください。

- ◆ 眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。

この他にも気になることがありましたら、主治医もしくは薬剤師にご相談ください。