

▶▶ 患者様用指導箋 ◀◀

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」 を服用される患者さんにお伝えください

▶ 主治医または薬剤師のみなさまへ

ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg「日新」の
重大な副作用として、**静脈血栓塞栓症、肝機能障害**の発現に注意が必要です。

これらの副作用の症状があらわれた場合には、**すぐに主治医へ相談するよう、患者さんへご指導をお願いいたします。**

本剤の実際の使用に際し、詳細は最新の
製品添付文書をご参照ください。

ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg「日新」 を服用される患者さんへ

ラロキシフェン
60 日新

：表裏同じ（白色）

このお薬は、閉経後女性の骨粗しょう症の治療に使われます。閉経後に女性ホルモン（エストロゲン）の分泌が低下したことによってバランスを崩した骨の代謝を正常に近づけて、骨量低下を改善します。骨粗しょう症のお薬は、継続して飲むことで効果が得られます。必ず主治医の指示に従って飲んでください。

お薬の飲み方

- ・1日1回1錠を包装から取り出して、水またはぬるま湯で飲んでください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時に、すぐに1回分を飲み、次回からは指示されたとおりに飲んでください。決して1日に2回もしくは一度に2回分を飲まないでください。
- ・誤って多く飲んだ場合は、主治医または薬剤師に相談してください。
- ・主治医の指示なしに、ご自分の判断でお薬を飲むのをやめないでください。

<裏面も必ずお読みください>

お薬を服用中の注意

このお薬を飲んで、以下のような症状があらわれた場合には、すぐに主治医に相談してください。

- ・片方のふくらはぎが赤く腫れる、ふくらはぎを押すと痛む
- ・急に息苦しく感じる、胸苦しさをを感じる
- ・急に視力が低下する
- ・全身けん怠感、食欲不振、吐き気など

手術後や長期安静期など、長期間寝たきりまたはそれに近い状態になる場合には、3日前までに、このお薬を飲むのを中止する必要がありますので、主治医に相談してください。

◆その他にも気になることがございましたら、主治医または薬剤師に相談してください。

医療機関名・連絡先：