

リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」

飲み方とご注意

毎週1回1錠を決められた曜日に飲んでください。毎日飲むお薬ではありません。

- 朝起きたら飲食前に、1回1錠をコップ1杯（約180mL）の水道水かぬるま湯で飲んでください。
- 飲んでから少なくとも30分は他のお薬や水以外の飲食をしないでください。水以外の飲料（カルシウム、マグネシウム等の含量の特に高いミネラルウォーターを含む）、食べ物、他のお薬と同時に飲むと、このお薬の吸収を妨げることがあります。
- 飲んでから少なくとも30分は横にならないでください。口や喉を刺激する可能性があるので、かんだり、なめたりせずに、寝る前や横になったまま飲まないでください。
- 飲み込むときの痛み、胸の痛みなどを感じた場合には、すぐに主治医に相談してください。

【飲み忘れに気づいたら】

気づいた日の翌朝に1錠だけ飲んでください。
絶対に同じ日に2錠を飲まないでください。翌週からはあらかじめ決まっている曜日に飲んでください。

【歯科・口腔外科を受診する場合】

このお薬を飲んでいることを歯科医師にお伝えください。

■医師と相談の上、このお薬による治療を開始する前に必要に応じて歯科検診を受け、できるかぎり抜歯などの治療を済ませてください。服薬中は、抜歯などの治療はできるかぎり避けてください。

■定期的に歯科を受診し、歯ぐきの状態のチェックを受け、ブラッシング（口腔清掃）指導、除石（歯石の除去）処置などを受けておくことが大切です。服薬中は、ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ってください。

■次の症状が出現した場合は、すみやかに医師、歯科医師、薬剤師に相談してください。

- ・口の中の痛み、特に抜歯後の痛みがなかなか治まらない
- ・歯ぐきに白色あるいは灰色の硬いものが出てきた
- ・あごが腫れてきた
- ・下くちびるがしびれた感じがする
- ・歯がぐらついてきて、自然に抜けた など