

ロピニロール錠 0.25mg・1mg・2mg「JG」
服用される患者さまへ

ロピニロール錠 0.25mg・1mg・2mg「JG」 服用される患者さまへ

飲む前に必ず本紙をお読みいただき、正しく服用してください。

自分の判断でお薬の量や回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。

体調が悪くなったり、気になる症状が出る場合は、必ず主治医にご相談ください。

自分の判断でお薬の量や回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。医師の指示なしにお薬の量や回数を変更したり、服用を中止したりすると、症状が悪化したり、副作用があらわれたりすることがあります。



この説明書には、特に注意していただきたい点だけを記載しています。

他にも気になる点がございましたら、主治医または薬剤師にご相談ください。

服用する際の注意事項

自動車の運転、機械の操作、高所作業などの危険を伴う作業はしないでください。

このお薬は、服用すると急に眠くなったり、何の前兆もなく眠り込んでしまうことがあります。このため、自動車の運転、機械の操作、高所作業などをすると事故につながる可能性がありますので、このような作業は行わないでください。なお、自分の判断でお薬の量や回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。



次のような症状がみられた場合は、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

- 急な眠り込み、ひどい眠気
- 幻覚、妄想
- めまい、立ちくらみ（ふらつき）
- 発熱、意識がぼんやりする
- 筋肉がひどくこわばる

〈連絡先〉

製品に関するお問い合わせ先

日本ジェネリック株式会社 お客様相談室

**受付時間：9時～18時（土、日、祝日を除く）
TEL 0120-893-170 FAX 0120-893-172**