

# セルトラリン錠「JG」を服用される 患者さまとそのご家族の方へ

よくお読みいただき、以下のことにご注意ください。

## ● 効果について

- このお薬は、飲みはじめは、すぐに効果はあらわれませんが、飲み続けると、脳内に作用し、脳内の神経伝達をスムーズにし、抑うつ気分や不安を和らげます。
- 6～17歳のうつ病性障害のある人がこのお薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったという報告があります。18歳未満のうつ病性障害のある人は、医師と十分に相談してください。

## ● 服用について

- このお薬は、徐々に飲む量を増やししながら、患者さまに必要な量を調整していきます。症状を改善するためには、決められた量のお薬を続けて服用することが大切です。
- このお薬は、体調が良くなったと自己判断して服用を中止したり、量を減らしたりすると、些細なことでも心配になる、いらいら、あせりなどの症状があらわれることがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## ● 服用中に注意する症状について

- うつ病やうつ状態の人は死んでしまいたいと感じることがあります。このお薬を飲んでいて、特に飲みはじめや飲む量を変更した時に、不安感が強くなり死にたいと思うなど症状が悪くなることがあるので、このような症状があらわれた場合は、医師に相談してください。
- 不安になる、いらいらする、あせる、興奮しやすい、発作的にパニック状態になる、ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来す、敵意を持つ、攻撃的になる、衝動的に行動する、じっとしていることができない、などの症状があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合は、医師に相談してください。このお薬との関連性は明らかではありませんが、これらの症状があらわれた人の中には、うつ症状などのもととある病気の症状が悪化する場合や、死んでしまいたいと感じたり、他人に対して危害を加えたりする場合があります。
- 眠気、めまいなどの症状があらわれることがあるため、自動車の運転などの危険を伴う機械を操作する時は、十分に注意してください。

(裏面に続く)

## ●ご家族や周囲のサポートについて

- ご家族の方は、死にたいという気持ちになる、興奮しやすい、攻撃的になる、ちょっとした刺激で気持ちの変調を来すなどの患者さまの行動の変化やうつ症状などのもともとある病気が悪化する危険性について医師から十分に理解できるまで説明を受け、患者さまの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、医師に連絡してください。また、患者さまご自身も病状に変化があったと感じた場合には、ご家族の方にも伝えるようにしてください。

	錠剤本体	PTPシート	
		おもて	うら
錠剤 25mg	 <p>長径:8.4mm 短径:4.1mm 厚さ:3.0mm</p>		
錠剤 50mg	 <p>直径:7.1mm 厚さ:3.6mm</p>		
錠剤 100mg	 <p>長径:12.2mm 短径:6.1mm 厚さ:4.4mm</p>		

他の医療機関を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

その他わからないことや気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先