

シロドシンOD錠 2mg/4mg 「JG」

服用される患者さまへ

このお薬は、「前立腺肥大症に伴う排尿障害」を改善するお薬です。

前立腺は年齢とともに徐々に大きくなり、「おしっこの勢いが弱い」、「おしっこが出にくい」、「トイレが近い」、「夜中に何度もトイレに起きる」などの症状があらわれます。

服用中の注意

このお薬には、以下のような副作用が起こることがあります。もし気になる症状があらわれた場合には、主治医にご相談ください。

- ◆ 射精時の精液量が少なくなる（射精障害）
- ◆ 立ち上がったときにふらつく
（ふらつき、めまい、立ちくらみ※）
- ◆ 便がやわらかくなる（下痢、軟便）
- ◆ □の中が渴く（□渴）
- ◆ 鼻がつまる（鼻閉）

※高所作業や自動車の運転などの危険を伴う作業に従事される方は、主治医にご相談ください。

お薬に淡黄赤色～黄赤色の斑点が不均一に入っているように見えますが、効き目に変わりはありません。

（裏面もご覧ください）

◇射精障害とは？

精管、精嚢（せいのおう）、膀胱頸部（膀胱出口）の収縮が抑えられるため、射精時の精液が減少したり出なくなる現象で、勃起障害（ED）ではありません。また、健康に害を及ぼすものではありません。

◇射精障害が起こったときに注意することは？

射精時の精液量の減少以外に症状はありません。

服用中または休薬により回復します。

ただし子どもを望む場合や、精液量の減少が気になる患者さまは、主治医にご相談ください。

◇その他、服用にあたって注意することは？

白内障などの眼科手術を受ける予定がある場合は、眼科の先生にこのお薬を飲んでいることをお伝えください。

症状が気になるなど、わからないことがある場合は医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先（医療機関・薬局）