









# シロドシンOD錠「日新」

を服用される患者さんへ

 OD錠 2 mg	  	淡黄赤色
 OD錠 4 mg	  	片面割線入りの淡黄赤色

このお薬は、前立腺肥大症に伴う排尿障害の治療に使われます。男性の膀胱の下に、尿道を取り巻くように存在している前立腺が肥大し、尿道が圧迫されることで生じる「尿が出にくい」、「トイレが近い」などの症状を改善します。

## お薬を服用中の注意

このお薬を飲んで、以下のような症状があらわれた場合には、主治医に相談してください。

### ◇射精障害

(射精時の精液量が減少したり、出なくなったりする)

### ◇立ちくらみ(立ち上がった時にふらつく、めまいが起こる)

### ◇口の中が渇く

### ◇下痢、軟便

### ◇鼻がつまる

<裏面も必ずお読みください>

## = 射精障害について =

このお薬が、精管、精囊<sup>せいのう</sup>、膀胱頸部(膀胱出口)の収縮を抑えてしまうことで、飲み始めの時期に射精障害があらわれることがあります。射精障害は勃起障害(ED)と異なります。射精時の精液量が減少したり、出なくなったりする現象で、健康に害を及ぼすものではありません。服用中または休薬により回復しますが、子どもを望む場合や、精液量の減少が気になる患者さんは、主治医に相談してください。

- ◆このお薬は、眼の筋肉に作用することがありますので、白内障などの眼科手術を受ける場合は、このお薬を飲んでいて、または以前飲んでいたことを、眼科医に伝えてください。
- ◆立ち上がった時に血圧が低下することがありますので、注意してください。
- ◆めまいなどがあらわれることがありますので、高所作業や自動車の運転など危険を伴う作業をする場合には注意してください。
- ◆このお薬は水なしで、舌の上で唾液を含ませ舌で軽くつぶして、唾液と一緒に飲むこともできます。寝たままの状態では、水なしで飲まないでください。

医療機関名・連絡先