

シルデナフィル錠RE「JG」 服用されるお子さまとその保護者の方へ

はいどうみゃくせいはいこうけつあつしょう

このお薬は、肺動脈性肺高血圧症を治療するお薬です。
肺の血管をひろげ、肺動脈の血圧を下げるはたらきがあります。

服用前の確認事項

以下にあてはまる項目がある場合は、服用する前に医師または薬剤師にご相談ください。

- ◆以前にシルデナフィル製剤を服用して、アレルギー（かゆみ、発疹など）を起こしたことがある
- ◆重い肝臓の病気がある
- ◆以下のお薬を服用している

お薬	病気
・ニトログリセリン ・亜硝酸アミル ・硝酸イソソルビド ・ニコランジル などの硝酸薬	狭心症など
・リトナビル含有製剤 ・ダルナビル含有製剤 ・コビシスタット含有製剤	HIV感染症など 新型コロナウイルス感染症など
・イトラコナゾール	真菌感染症など
・リオシグアト	肺高血圧症

この他にも、現在治療中の病気がある場合や、他のお薬と一緒に飲むときには、事前に医師または薬剤師にご相談ください。

服用回数・服用量

このお薬は、1歳以上で体重20kgを超えるお子さまに使用できます。

1回20mg（1錠）を1日3回服用してください。

注意が必要な副作用①

このお薬を飲んでいるときには、以下のようなことに注意し、症状があらわれた場合には、医師にご連絡ください。

<眼に関する症状>

◆急激な視力低下や視力喪失などの症状があらわれたら、

すぐに眼科を受診してください。

◆血圧低下によるめまいや視覚障害（しかくしょうがい眼のかすみ、見えにくい）、色視症（しきししょう物体が本来とは違う色に見える）、霧視（むし眼の前に霧がかかったような感じ）があらわれることがあります。自転車や遊具で遊ぶ際には十分注意してください。

※このお薬を長期間服用する場合には、眼科的検査を行うことがあります。

注意が必要な副作用②

<耳に関する症状>

とっばつせいなんちょう

- ◆急激な聴力低下（聞こえにくい）や突発性難聴（耳鳴り、めまいを伴うことがある）などの症状があらわれたら、すぐに耳鼻科を受診してください。

<その他の症状>

- ◆ぼっ起が4時間以上続く可能性があり、6時間以上ぼっ起が続いた場合、処置が遅れるとぼっ起機能が失われることがあります。
ぼっ起が4時間以上続いたら、ただちに医師の診察を受けてください。
- ◆鼻出血することがあります。

主な副作用

頭がいたくなったり、顔が赤くなったりするなど、血管がひろがることで生じる副作用がよくみられます。

この他にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

保護者の方へ

小さなお子さまでは、自分で気になる症状を訴えることが難しい場合がありますので、次のようなことを感じていないか、声がけするなどしてください。

症状を訴えた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

- ◇ 周りがぼやけて見える
 - ◇ 目がちかちかする
 - ◇ ふらふらする
 - ◇ 気持ちが悪い
- など

気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先

 日本ジェネリック株式会社

SLDRE-PG2-1JG
2025.11