

# ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg/5mg「JG」

## 服用される患者さまへ



(実寸ではありません)

このお薬は、過活動膀胱における症状を改善するお薬です。

### 服用時の注意

- ◇ 1日1回飲むお薬です。  
1回に服用する量は人によって異なります。  
必ず主治医の先生の指示に従ってください。
- ◇ 毎日同じ時間に飲むようにしましょう。
- ◇ 包装シート（PTPシート）から取り出して服用してください。
- ◇ 水なしで飲むこともできます。また、コップ1杯程度の水またはぬるま湯と一緒に飲むこともできます。
- ◇ 身体を起こした姿勢で、飲んでください。
- ◇ かみ砕かず、そのまま飲んでください。

このお薬は毎日続けて飲むことが大切です。

主治医の先生や薬剤師の指示なしに自分の判断で飲むのをやめたりしないでください。

(裏面もお読みください)

## 主な副作用

### ◇ 口内乾燥（口が乾く）

症状が出た場合はうがいをしたり、氷を口に含んだり、ガムやあめをなめるなど、唾液分泌を促すようにしましょう。

### ◇ 便秘

食物繊維の多い食事を摂る、適度な運動をするなど、生活習慣を見直してみましょう。

症状がひどくてつらいときは、主治医の先生に相談してください。

### ◇ 排尿困難（尿が出にくい）、尿閉（尿がでなくなる）

このような症状があらわれた場合には、服用を中止し、主治医の先生に相談してください。

### ◇ 目のかすみ、めまいなど

高所作業、自動車の運転など危険を伴う作業をする場合には、十分注意してください。

他のお薬と一緒に服用すると、このお薬の作用がよくなったり、望ましくない作用（副作用）が出ることがあります。

他の医療機関にかかるときや、薬局で薬を買うときは必ずこのお薬を服用していることを伝えてください。

他にも気になる症状があらわれた場合には、主治医の先生に相談してください。