

スマトリプタン錠50mg「JG」 服用される患者さまへ



服用方法

1回および1日の服用量は主治医または
薬剤師の指示を守ってください。

- このお薬は**1回最大2錠**まで、**1日最大4錠**まで服用できます。
- 片頭痛の痛みを感じたら、我慢せずに早めに服用してください。
- 効果が不十分な場合には、**前回の服用から2時間以上の間隔をあけて追加**することができます。
- 1回1錠の服用で効果が不十分な場合には、次の片頭痛発作時からは1回2錠を服用することができます。



≡ 服用時の注意 ≡

- このお薬以外に服用しているお薬がある場合は、主治医または薬剤師に相談してください。
 - このお薬を服用後にスマトリプタン点鼻液を使用する場合、もしくはその逆の場合は2時間以上の間隔をあけてください。
 - このお薬を服用後にスマトリプタン注（自己注射剤を含む）を使用する場合は、2時間以上（逆の場合は1時間以上）の間隔をあけてください。
 - このお薬を服用後にエルゴタミン製剤や他のトリプタン製剤を使用する場合、もしくはその逆の場合は24時間以上の間隔をあけてください。
- 服用後、全く効果がない場合や不快な症状を感じた場合には、それ以上このお薬を服用しないで主治医に相談してください。
- このお薬は片頭痛発作の治療薬です。片頭痛以外の頭痛、または片頭痛発作の予防として服用してはいけません。
- 今までに経験のない（いつもの片頭痛とは違う）頭痛が起こった場合には、このお薬を服用せずに、主治医に相談してください。
- 患者さんによっては、片頭痛やお薬の効果の為に眠気を感じる場合がありますので、自動車の運転などは避けてください。