

テルビナフィン錠125mg「CH」 服用される患者さまへ

このお薬は、白癬菌（カビの一種）が起こす皮膚の病気で、皮膚の深いところや爪にできるもの、ひどい水虫やたむしなどの治療に使用されます。



《次の方は必ず医師または薬剤師にご相談ください。》

- ◇ 以前にお薬を飲んで、かゆみ、発疹などが出たことがある方。
- ◇ 肝臓、血液の病気がある方。
- ◇ 妊娠中・妊娠している可能性がある方。授乳中の方。
- ◇ 他のお薬を使用している方（薬局で購入したお薬も含む）。

《お薬の飲み方》

- ◇ 必ず医師または薬剤師の指示に従い、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。
- ◇ 飲み忘れた場合
気がついた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回飛ばして、次の時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲まないでください。
- ◇ 誤って多く使用した場合
悪心（吐き気）、腹痛、めまいがあらわれることがあります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、すぐに受診してください。

《服用中に気を付けること》

眠気、めまい・ふらつきなどの症状があらわれることがありますので、高いところでの作業、自動車の運転など危険を伴う機械を操作するときには十分に注意してください。

血液検査

患者さまによっては、このお薬を服用中に肝障害、血液障害があらわれることがあります。

服用期間中は、医師の指示に従い

肝機能検査、血液検査を受けてください。

《この様な症状に気付いたら》

次の症状があらわれた場合には、ただちに医師または薬剤師にご相談ください。

- ◆ 発疹、体のかゆみ
- ◆ 食欲がなくなる、吐き気がする
- ◆ 体がだるくなる
- ◆ 熱がでる
- ◆ 出血しやすい、あおあざができる
- ◆ 尿の色が濃くなる
- ◆ 白目や皮膚が黄色くなる

他にも気になる症状があらわれたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先