

トアラセット配合錠「JG」 服用される患者さまへ

このお薬は、痛みを抑える2つの有効成分
(トラマドール、アセトアミノフェン)
が配合されています。



トラマドール
アセトアミノフェン

- ◆ これらの有効成分が含まれるほかのお薬と一緒に服用しないでください。
- ◆ 特にアセトアミノフェンは解熱鎮痛薬や総合感冒薬（風邪薬）に含まれていることがあります。

副作用について

- ◇ 便秘（下剤と一緒に服用することがあります）
- ◇ 吐き気・嘔吐*
- ◇ 眠気*
- ◇ めまい*

自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。

「吐き気・嘔吐」は1～2週間、「眠気」は4～5日でおさまることが多いですが、症状がおさまらない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

*飲み始めの時期にあらわれることがあります。

（裏面もご覧ください）

服用時の注意

- ◇ 1回1錠、1日4錠服用が標準ですが、医師の指示どおりに服用してください。
- ◇ 1回2錠、1日8錠を超えて服用しないでください。
- ◇ 服用間隔は4時間以上あけてください。
- ◇ 誤って多く服用した場合は、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- ◇ **飲酒を避けてください。**多量のアルコールによって副作用が出やすくなります。
- ◇ 妊婦または妊娠している可能性がある人は、医師にご相談ください。
- ◇ 授乳中の方は、授乳を中止してください。
- ◇ 自分の判断で服用を中止しないでください。

気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先