

ツロブテロールテープ0.5mg・1mg・2mg「テイコク」 を使用されている患者さまへ

〈貼り方〉


1

このテープは、胸・背中・上腕のいずれかに貼って使用します。
あらかじめ貼るところを乾いたタオル等でよく拭きます。2カ所の切り口とも切り離し、テープを取出します。



2

「ライナー」と書いてある面を山折りに浮かして、片方のライナーをはがします。**接着面にふれたり、テープを強く引っ張ったりしないようにしてください。**



3

ライナーの残ったほうを持ち、胸・背中・上腕のいずれかに貼ります。軽く押さえながら残りのライナーをはがし、テープ全体を貼ります。その後、上からしっかりと押さえます。




医師または薬剤師の指示に従って正しくご使用ください。

- このテープは、今のあなたの症状に合わせて処方されたお薬です。
- このお薬を家族や他の人に渡さないでください。



貼る時の注意

- 貼るところ( 部分)

胸・背中・上腕のいずれかに
貼ってください。



胸



背中



上腕

- テープは必ず1日1回貼りかえてください。
- 接着面にふれないようにしてください。粘着力が低下して、うまく貼れなくなることがあります。
- 1度はがしたテープは、貼り直すことができません。
- 傷口や湿疹のあるところ、汗をかきやすいところやクリーム・軟膏等をぬったところには貼らないでください。
- テープを自分ではがしてしまう可能性がある方に貼る場合は、本人の手が届かないところに貼ってあげてください。
- テープがはがれかけた場合は、刺激の少ない絆創膏等の上から固定してください。
- 同じところに貼り続けると、かゆみやかぶれが生じる場合があります。貼りかえる時は別のところに貼ってください。

テープを使って「何か変だな」と感じたら医師または薬剤師に相談してください。

保管上の注意

- 使用する直前まで袋を開封しないでください。
- 直射日光や高温の場所を避けて保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。